
ZENTEL

Versión: GDS25/IP109

ZENTEL

Albendazol

Composición Cualitativa y Cuantitativa

Tabletas masticables que contienen 200 mg o 400 mg de albendazol.
Suspensión al 4 % p/v para administración oral; 4 g albendazol por 100 mL.
Suspensión al 2 % p/v para administración oral; 2 g de albendazol por 100 mL.

Forma Farmacéutica

Tableta masticable
Suspensión

Detalles Clínicos

Indicaciones

ZENTEL es un carbamato de bencimidazol con actividad antihelmíntica y anti-protozoarios, eficaz en el tratamiento contra los siguientes parásitos intestinales y tisulares: gusanos redondos (*Ascaris lumbricoides*), gusanos en forma de alfiler (*Enterobius vermicularis*), gusanos en forma de gancho (*Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*), gusanos en forma de látigo (*Trichuris trichiura*), gusanos filariformes (*Strongyloides stercoralis*), gusanos en forma de cinta (*Taenia spp* e *Hymenolepis nana* solamente en el caso de parasitismo asociado) y larva migrans cutánea; giardiasis (*G. lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*, *Lamblia intestinalis*) en niños.

Dosis y Vía de Administración

Dosis

Indicaciones	Edad	Dosis	Periodo
Gusanos redondos Gusanos en forma de alfiler* Gusanos en forma de gancho Gusanos en forma de látigo	Adultos y niños mayores de 2 años	400 mg [dos tabletas de 200 mg o una tableta de 400 mg o 10 mL de suspensión al 4% o 20 mL de suspensión al 2%]#	Dosis única
	Niños de 1 a 2 años de edad	200 mg (una tableta de 200 mg o 5 mL de suspensión al 4% o 10 mL de suspensión al 2%)	Dosis única
Estrongiloidiasis Teniasis Himenolepiasis [†]	Adultos y niños mayores de 2 años	400 mg (# vea anteriormente)	Una dosis al día durante 3 días
Larva migrans cutánea	Adultos y niños mayores de 2 años.	400 mg	Una dosis al día durante 1 a 3 días
Giardiasis	Solamente niños de 2 a 12 años	400 mg (# vea anteriormente)	Una dosis al día durante 5 días

*Para lograr una cura completa en el caso de la infestación por gusanos en forma de alfiler, prescriba estrictas medidas de higiene, y trate también a los familiares e individuos que comparten la misma vivienda.
[†]En casos de himenolepiasis demostrada, se recomienda repetir el tratamiento en 10 a 21 días.

Método de Administración

Si el paciente no se cura después de tres semanas, está indicado un segundo curso de tratamiento. No se requieren procedimientos especiales, como el ayuno o el uso de laxantes. Las tabletas pueden masticarse o tomarse con agua. Algunas personas, especialmente los niños pequeños, podrían experimentar algunas dificultades para deglutir las tabletas enteras, por lo cual se les deberá alentar a que las mastiquen con un poco de agua; de manera alterna, se pueden triturar las tabletas.

Poblaciones Especiales de Pacientes

Ancianos

La experiencia en pacientes de 65 años de edad o mayores es limitada. Los reportes indican que no se requieren ajustes de las dosis; sin embargo, el **ZENTEL** debe usarse con precaución en pacientes de edad avanzada con evidencia de insuficiencia hepática (vea Insuficiencia Hepática y Farmacocinética).

Insuficiencia Renal

Como la eliminación renal del albendazol y su principal metabolito, el sulfóxido de albendazol, es insignificante, es improbable que la depuración de estos compuestos se vea alterada en estos pacientes. No se requieren ajustes de las dosis; sin embargo, los pacientes con evidencia de insuficiencia renal deben ser monitoreados cuidadosamente.

Insuficiencia Hepática

Como el albendazol es metabolizado rápidamente por el hígado para formar el metabolito principal farmacológicamente activo, el sulfóxido de albendazol, se espera que la insuficiencia hepática tenga efectos significativos en la farmacocinética del sulfóxido de albendazol. Los pacientes con resultados anormales de las pruebas de función hepática (transaminasas) antes de comenzar la terapia con albendazol deben ser monitoreados cuidadosamente.

Contraindicaciones

ZENTEL no debe administrarse durante el embarazo, ni en mujeres que se piense que están embarazadas. **ZENTEL** está contraindicado en pacientes con una historia conocida de hipersensibilidad al fármaco (albendazol o demás constituyentes).

Advertencias y Precauciones

Para evitar la administración de **ZENTEL** durante el embarazo temprano, las mujeres en edad de concebir deben iniciar el tratamiento durante la primera semana de la menstruación o después de una prueba negativa de embarazo.

El tratamiento con **ZENTEL** podría revelar una neurocisticercosis preexistente, especialmente en áreas con una infección aguda por taenosis. Los pacientes podrían experimentar síntomas neurológicos como convulsiones, incremento en la presión intracraneal y signos focales, como resultado de una reacción inflamatoria ocasionada por

la muerte de los parásitos en el cerebro. Los síntomas podrían presentarse poco después de administrar el tratamiento, por lo cual deberá iniciarse inmediatamente una terapia adecuada con esteroides y anticonvulsivos. **ZENTEL** suspensión contiene ácido benzoico, el cual es un irritante leve para la piel, ojos y membranas mucosas. Puede aumentar el riesgo de ictericia en los bebés recién nacidos.

Interacciones

Se ha reportado que el praziquantel aumenta los niveles plasmáticos del metabolito activo del albendazol. Ritonavir, fenitoína, carbamazepina y fenobarbital pueden tener el potencial de reducir la concentración en plasma del metabolito activo de albendazol; sulfóxido de albendazol. La relevancia clínica de esto es desconocida, pero puede resultar en la disminución de la eficacia, especialmente en el tratamiento de helmintosis sistémica. La eficacia debería ser monitoreada en los pacientes y podrían requerir un régimen alternativo de dosis o terapia.

Embarazo y Lactancia

Embarazo

ZENTEL no debe administrarse durante el embarazo ni en mujeres que se piense que están embarazadas (vea Contraindicaciones).

Lactancia

No se sabe si el albendazol o sus metabolitos se secretan en la leche materna humana. Por lo tanto, **ZENTEL** no debe usarse durante la lactancia, a menos que se considere que los beneficios potenciales superan a los riesgos potenciales asociados con el tratamiento.

Efectos en la Habilidad para Conducir Automóviles y Usar Maquinarias

No se tienen estudios para investigar el efecto de **ZENTEL** sobre el desempeño al manejar o la capacidad para operar maquinaria. Sin embargo, al manejar vehículos u operar maquinaria, deberá tomarse en cuenta que se han reportado mareos después de usar **ZENTEL** (ver reacciones adversas).

Reacciones Adversas

Los datos de grandes estudios clínicos se usaron para determinar las frecuencias de las reacciones indeseables muy comunes a raras. Las frecuencias asignadas a todas las demás reacciones indeseables (es, decir, aquellas que ocurren a una frecuencia < 1/1000) fueron determinados principalmente usando los datos post-comercialización, y se refieren a una tasa de reporte, más que a una frecuencia real.

La siguiente convención ha sido usada para la clasificación de las frecuencias:

Muy comunes	≥1/10
Comunes	≥1/100 a <1/10
Poco comunes	≥ 1/1000 a < 1/100
Raras	≥ 1/10000 a < 1/1000
Muy raras	< 1/10000

Trastornos del Sistema Inmunológico

Raros Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo rash, prurito y urticaria.

Trastornos del Sistema Nervioso Central

Poco comunes cefalea y vértigo.

Trastornos Gastrointestinales

Poco comunes: Síntomas del tracto gastrointestinal superior (por ejemplo, dolor epigástrico o abdominal, náusea, vómito) y diarrea.

Trastornos Hepatobiliares

Raros: Elevaciones de las enzimas hepáticas

Trastornos Cutáneos y del Tejido Subcutáneo

Muy raros: Eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson

Sobredosificación

Tratamiento

El tratamiento ulterior deberá ser como se indique clínicamente, o como lo recomiende el centro nacional de toxicología, donde esté disponible.

Propiedades Farmacológicas

Farmacodinámica

Código ATC

P02CA03

Mecanismo de Acción

Albendazol tiene actividad larvicida, ovidica y vermícida, y se considera que su efecto antihelmíntico mediante la inhibición de la polimerización de la tubulina. Esto causa la alteración del metabolismo del helminto, incluyendo depleción de la energía, lo que inmoviliza y mata los helmintos susceptibles.

Farmacocinética

Absorción

En el hombre, albendazol es pobremente absorbido (menos de 5%) después de la administración oral. El efecto farmacológico sistémico de albendazol se aumenta si la dosis se administra con una comida rica en grasa, que aumenta aproximadamente cinco veces la absorción.

Distribución

Se ha reportado que después de la administración oral de una dosis única de 400 mg de albendazol, el metabolito farmacológicamente activo, sulfóxido de albendazol, alcanza concentraciones plasmáticas de 1.6 a 6.0 micromol/L cuando se toma con el desayuno.

Metabolismo

Albendazol rápidamente sufre extenso metabolismo de primer paso en el hígado, y generalmente no se detecta en plasma. Sulfoxido de albendazol es el metabolito primario, el cual se considera es el activo medio en la eficacia contra infestaciones tisulares sistémicas.

Eliminación

La vida media plasmática de sulfoxido de albendazol es de 8.5 horas.

Sulfoxido de albendazol y sus metabolitos parecen ser principalmente eliminados en la bilis, con sólo una pequeña proporción apareciendo en la orina.

Poblaciones Especiales de Pacientes

Ancianos

Aunque no se han realizado estudios para investigar el efecto de la edad en la farmacocinética del sulfoxido de albendazol, los datos de 26 pacientes cisto hidatídicos (de hasta 79 años de edad) sugieren que la farmacocinética es similar a la de los sujetos sanos jóvenes. El número de pacientes ancianos tratados para enfermedad hidatídica o neurocisticercosis es limitado, pero no se han observado problemas asociados con una población de edad avanzada.

Insuficiencia Renal

No se ha estudiado la farmacocinética del albendazol en pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia Hepática

No se ha estudiado la farmacocinética del albendazol en pacientes con insuficiencia hepática.

Detalles Farmacéuticos

Lista de Excipientes

Tabletas 200 mg	Tabletas 400 mg	Suspensión (2%, 4%)
Lactosa	Lactosa	Silicato de aluminio y magnesio
Almidón de maíz	Celulosa microcristalina	Carboximetilcelulosa sódica
Polividona	Almidón de maíz	Glicerina
Lauril sulfato de sodio	Croscaramelosa sódica	Polisorbato 80
Glicolato sódico de almidón	Povidona K30	Monolaureato de sorbitán
Celulosa microcristalina	Lauril sulfato de sodio	Sorbato de potasio
Sacarina sódica	Laca Amarillo Sunset	Acido benzoico (ver
Estearato de magnesio *	Sacarina sódica	Advertencias y Precauciones)
Película de recubrimiento	Estearato de magnesio *	Ácido Sórbico
Metilhidroxipropilcelulosa 15	Saborizantes	Silicón antiespumante 1510
Metilhidroxipropilcelulosa 5		Sacarina sódica
Propileno glicol.		Saborizantes

* El estearato de magnesio es de origen vegetal O los registrados localmente

Vida de Anaquel

La fecha de caducidad está indicada en el empaque.

Precauciones Especiales para su Almacenamiento

Tabletas

Almacenar a una temperatura por debajo de 30°C. La vida de arancel depende de las condiciones de almacenamiento registradas localmente (para información refiérase al empaque).

Suspensiones

Almacenar a una temperatura por debajo de 30°C, y proteger de la luz solar directa.

Naturaleza y Contenido del Envase

Tabletas

Blisters, contenedores y tapa de polipropileno.

Suspensiones

Frasco de vidrio/plástico con tapa de aluminio.

Instrucciones para su Uso/Manejo

Suspensiones: Agitar bien antes de usar.

No todas las presentaciones están disponibles en todos los países.

Versión: GDS25/IP109
Fecha de emisión: 04 enero 2017

ZENTEL es una marca registrada del grupo de compañías GSK