

Pharma code Ref. No. 2970



GSK0173D

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЗИРТЕК



Торговое название препарата: Зиртек
Действующее вещество (МНН): цетиризина дигидрохлорид
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь.
Состав:
Одна покрытая пленочной оболочкой таблетка содержит:
активный ингредиент: цетиризина дигидрохлорид 10,0 мг;
неактивные ингредиенты: целлюлоза микрокристаллическая 37,0 мг, лактозы моногидрат 66,4 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 0,6 мг, магния стearat 1,0-1,51 мг;
состав пленочной оболочки таблетки: Опладрай Y-1-7000 3,45 мг (гидроксипропилметилцеллюлоза (E464) 2,156 мг, титана диоксид (E171) 1,078 мг, макрогол 400 0,216 мг).
¹ Зависит от условий производства и оборудования (варьирует в пределах от 1,0 до 1,5 мг на таблетку)
1 мл капель для приема внутрь (эквивалентно 20 каплям) содержит:
активный ингредиент: цетиризина дигидрохлорид 10,0 мг;
неактивные ингредиенты: глицерол 85%, 294,10 мг, пропиленгликоль 350,0 мг, сахарин натрия 10,0 мг, метилпарагидроксибензоат 1,35 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,15 мг, ацетат натрия 10,0 мг, наданая уксусная кислота 0,53 мг, вода очищенная 404 мг (от 384 мг до 424 мг).
Описание:
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Продолговатая таблетка белого цвета, покрытая пленочной оболочкой, с разделительной риской и маркировкой «YU».
Капли для приема внутрь
Прозрачная бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом и горьким ароматом.
Фармакотерапевтическая группа: антигистаминные препараты системного действия, производные пипразина.
Код АТХ: R06AE07
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Цетиризин, чeловеческий метаболит гидроксизина, является мощным и селективным антагонистом периферических H₁-рецепторов. Исследования связывания *in vitro* показали отсутствие подающегогoа измеренногo средства к другим рецепторам, помимо H₁-рецепторов. Эксперименты на мышах показали, что при системном введении цетиризина не связывается с H₁-рецепторами в головном мозге в значительной степени.
Было показано, что в дополнение к основному анти-H₁-гистаминному эффекту, цетиризин демонстрирует прогисталлергическое действие: при применении в дозе 10 мг один раз или два раза в сутки он уменьшает миграцию воспалительных клеток, в частности, эозинофилов, в кожу и конъюнктиву на поздних стадиях аллергических реакций у пациентов с атопией после контакта с аллергеном, а в дозе 30 мг/сутки препятствует притоку эозинофилов в жидкость бронхоальвеолярного лаважа во время поздней фазы сужения бронхов, индуцированного ингаляцией аллергена у пациентов с бронхиальной астмой. Кроме того, цетиризин угнетает позднюю фазу воспалительной реакции, индуцированную внутрикожным введением капприлена у пациентов с хронической крапивницей. Он также регулирует по типу отрицательной обратной связи экспрессию молекул адгезии, таких как ICAM-1 и VCAM-1, которые являются маркерами аллергического воспаления.
Исследования на здоровых добровольцах показали, что цетиризин в дозах 5 мг и 10 мг стойко подавляет кожную реакцию по типу цветения в ответ на введение очень высоких концентраций гистамина, однако корреляция с эффективностью не установлена. После введения

однократной дозы 10 мг действие начинается в пределах 20 минут у 50 % пациентов, и в течение одного часа у 95 % пациентов. После однократного введения эта активность сохраняется на протяжении, по меньшей мере, 24 часов.
В 6-недельном плацебо-контролируемом исследовании с участием 186 пациентов с аллергическим ринитом и сопутствующей бронхиальной астмой легкой или умеренной степени тяжести цетиризин в дозе 10 мг при применении один раз в сутки уменьшал симптомы ринита и не влиял на функцию легких. Это исследование подтверждает безопасность применения цетиризина у пациентов с аллергией и бронхиальной астмой легкой или умеренной степени тяжести.
В плацебо-контролируемом исследовании цетиризина, применяемый в высокой суточной дозе 60 мг в течение семи дней, не вызвал статистически значимого удлинения интервала QT. Было продемонстрировано, что цетиризин в рекомендуемой дозе улучшает качество жизни пациентов с круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом.
В 35-дневном исследовании с участием детей в возрасте от 5 до 12 лет не было выявлено развития толерантности к антигистаминному действию цетиризина (подавление развития кожной реакции по типу цветения). После прекращения лечения с многократным введением цетиризина, нормальная чувствительность кожи к гистамину восстанавливается в течение 3 дней.
Фармакокинетика
Всасывание
Равновесная максимальная концентрация в плазме крови составляет около 300 нг/мл и достигается в течение 1,0 ± 0,5 ч.
Распределение таких фармакокинетических параметров, как максимальная концентрация в плазме крови (C_{max}) и площадь под кривой (AUC), является уникальным. Пища не влияет на степень всасывания цетиризина, однако снижает скорость всасывания. Степень биодоступности цетиризина сопоставима при применении в виде растворов, капсул или таблеток.
Распределение
Какуюсь объем распределения составляет 0,50 л/кг. Связывание цетиризина с белками плазмы крови составляет 93 ± 0,3%. Цетиризин не влияет на связывание с белками варфарина.
Метаболизм и выведение
Цетиризин не подвергается активному метаболизму первого прохождения. Приблизительно две трети дозы выделяется в неизменном виде с мочой. Терминальный период полувыведения составляет приблизительно 10 часов и при этом не наблюдается накопления цетиризина в тканях организма при 10-дневном приеме суточной дозы в 10 мг.
Цетиризин характеризуется линейной кинетикой в диапазоне доз от 5 до 60 мг.
Особые группы пациентов
Дети
Период полувыведения цетиризина у детей 6 - 12 лет составлял около 6 часов и у детей 2 - 6 лет – 5 часов.
Пациенты пожилого возраста
У 16 пациентов пожилого возраста после однократного приема внутрь дозы 10 мг период полувыведения увеличился приблизительно на 50 %, а клиренс снижлся на 40% по сравнению с пациентами более молодого возраста. Возможно, уменьшение клиренса цетиризина у этих добровольцев пожилого возраста связано со снижением функции почек.
Пациенты с нарушением функции почек
Фармакокинетика препарата у пациентов с нарушением легкой степени (клиренс креатинина выше 40 мл/мин) и здоровых добровольцев была сходной. У пациентов с нарушением функции почек умеренной степени период полувыведения увеличился в 3 раза, и клиренс снижился на 70% по сравнению со здоровыми добровольцами.
У пациентов на гемодиализе (клиренс креатинина менее 7 мл/мин), принимавших внутрь однократно цетиризин в дозе 10 мг, наблюдалось 3-кратное увеличение периода полувыведения и 70%-ное снижение клиренса по сравнению с нормальными значениями. Цетиризин плохо выводится при гемодиализе. Пациентам с нарушением функции почек умеренной или тяжелой степени необходима коррекция дозы.

Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с хроническими заболеваниями печени (гепатоцеллюлярным, холестатическим и биллярным циррозом), получавших цетиризин однократно в дозе 10 или 20 мг, было отмечено 50% увеличение периода полувыведения наряду с 40% уменьшением клиренса по сравнению со здоровыми людьми.
Корректировка дозы необходима у пациентов с нарушением функции печени только при наличии сопутствующего нарушения функции почек.
Показания к применению
Препарат Зиртек показан для облегчения:
• назальных и глазных симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита;
• симптомов крапивницы.
Способ применения и дозы
Таблетки следует проглатывать целиком, запивая стаканом жидкости.
Капли перед применением следует развести в жидкости.
Способ применения
Для приема внутрь.
Взрослые
10 мг (20 капель или 1 таблетка) один раз в сутки.
Применение препарата можно начать с дозы 5 мг (10 капель или половина таблетки), если она обеспечит удовлетворительное облегчение симптомов.
Дети
Дети в возрасте от 2 до 6 лет
2,5 мг (5 капель) два раза в сутки.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет
5 мг (10 капель или половина таблетки) два раза в сутки.
Дети в возрасте старше 12 лет
10 мг (20 капель или 1 таблетка) один раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста
Имеются данные, позволяющие предположить, что пациентам пожилого возраста с нормальной функцией почек корректировки дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек
Поскольку цетиризин преимущественно выводится почками, в случаях, когда альтернативная терапия не может быть использована, интервалы между приемами препарата следует подбирать индивидуально в зависимости от функции почек. Используя приведенную ниже таблицу, дозу корректируют в соответствии с соответствиями.

$$C_{cr} = \frac{140 - \text{возраст (лет)}}{72} \times \text{масса (кг)} \quad (\times 0,85 \text{ для женщин})$$

Коррекция дозы у взрослых пациентов с нарушением функции почек

Группа	Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (мл/мин)	Дозирование и частота приема
Нормальная функция почек	≥ 90	10 мг один раз в сутки
Легкое снижение функции почек	60 - < 90	10 мг один раз в сутки
Умеренно сниженная функция почек	30 - < 60	5 мг один раз в сутки
Выраженно сниженная функция почек	15 - < 30 не требующая лечения диапазон	5 мг один раз в 2 дня
Терминальная стадия болезни почек	< 15 требующая лечения диапазон	Противопоказано



200 mm Measuring Bar

Пациенты с нарушением функции печени
Пациентам только с нарушением функции печени, не требуется корректировки дозы.
Пациенты с нарушением функции почек
Пациентам с нарушением функции почек и с нарушением функции печени.
Рекомендуется корректировка дозы (см. выше «Пациенты с нарушением функции почек»).

Побочные действия
Данные, полученные в клинических исследованиях
Клинические исследования показали, что цетиризин в рекомендуемой дозировке вызывает незначительные нежелательные эффекты со стороны ЦНС, включающие сонливость, утомляемость, головокружение и головную боль.
В некоторых случаях сообщалось о парадоксальной стимуляции ЦНС.
Несмотря на то, что цетиризин является селективным антагонистом периферических H₁-рецепторов и характеризуется практически полным отсутствием антихолинергической активности, были зарегистрированы единичные случаи затруднения мочеиспускания, нарушения accommodation глаза и сухости во рту.
Были получены сообщения о случаях нарушения функции печени с повышением печеночных ферментов, сопровождавшихся повышением билирубина. Большинство этих явлений разрешилось после прекращения терапии цетиризином.
Двойные слепые контролируемые клинические исследования по сравнению цетиризина с плацебо или другими антигистаминными препаратами в рекомендуемой дозировке (10 мг в сутки для цетиризина), для которых доступны количественные данные по безопасности, включали более 3200 пациентов, принимавших цетиризин.
В плацебо-контролируемых исследованиях из этого общего количества были зарегистрированы следующие нежелательные явления для цетиризина 10 мг с частотой встречаемости 1,0% или выше:

Нежелательные реакции (терминология нежелательных реакций ВОЗ)	Цетиризин 10 мг (n=3280)	Плацебо (n=3061)
Общие расстройства и реакции в месте введения		
Утомляемость	1,63%	0,95%
Нарушения со стороны нервной системы		
Головокружение	1,10%	0,98%
Головная боль	7,42%	8,07%
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта		
Боль в животе	0,98%	1,08%
Сухость во рту	2,09%	0,82%
Тошнота	1,07%	1,14%
Нарушения психики		
Сонливость	9,63%	5,00%
Нарушения со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки		
Фарингит	1,29%	1,34%

Дети
Нежелательные реакции с частотой встречаемости 1 % или выше у детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, включенных в плацебо-контролируемые клинические исследования, включают:

Нежелательные реакции (терминология нежелательных реакций ВОЗ)	Цетиризин (n=1656)	Плацебо (n=1294)
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта		
Диарея	1,0%	0,6%
Нарушения психики		
Сонливость	1,8%	1,4%
Нарушения со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки		
Ринит	1,4%	1,1%
Общие расстройства и реакции в месте введения		
Утомляемость	1,0%	0,3%

Пострегистрационные данные
Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) перечислены ниже в соответствии с классами систем органов MedDRA и частотой встречаемости следующим образом:
Частота встречаемости определялась следующим образом:
очень часто ≥1/10
часто ≥1/100, но <1/10
нередко ≥1/1000, но <1/100
очень редко ≥1/10000, но <1/1000
неизвестно <1/10 000 (невозможно оценить на основании доступных данных).
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
Очень редко: тромбоцитопения
Нарушения со стороны иммунной системы
Редко: гиперчувствительность
Очень редко: анафилактический шок
Нарушения со стороны обмена веществ и питания
Неизвестно: повышение аппетита
Нарушения психики
Нечасто: возбуждение
Редко: агрессия, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, бессонница
Очень редко: тики
Неизвестно: суицидальное мышление, кошмары
Нарушения со стороны нервной системы
Нечасто: парестезия
Редко: судороги
Очень редко: дисгевзия, дискинезия, дистония, обморок, тремор
Неизвестно: амнезия, нарушение памяти
Нарушения со стороны органов зрения
Очень редко: нарушения accommodation, нечеткость зрения, окулоптерный криз
Нарушения со стороны органов слуха и лабиринтные нарушения
Неизвестно: головокружение (вертиго)
Нарушения со стороны сердца
Редко: тахикардия
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Нечасто: диарея

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
Редко: отклонение от нормы функциональных проб печени (повышение трансаминаз, повышение концентрации билирубина в крови, повышение активности щелочной фосфатазы в крови, повышение гамма-глутамилтрансферазы)
Неизвестно: гепатит
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Нечасто: зуд, сыпь
Редко: крапивница
Очень редко: ангионевротический отек, фиксированная лекарственная сыпь
Неизвестно: острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП)
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани
Неизвестно: артралгия, миалгия
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
Очень редко: дисурия, энурез
Неизвестно: задержка мочи (см. раздел "Особые указания")
Общие расстройства и нарушения в месте введения
Нечасто: астения, недомогание
Редко: отеки
Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований
Редко: увеличение массы тела
Кожные реакции, возникающие после отмены цетиризина
После отмены цетиризина были отмечены зуд (сильный зуд) и/или крапивница (см. раздел "Особые указания").
Противопоказания
Препарат Зиртек противопоказан при:
• повышенной чувствительности к любому из компонентов данного препарата, к гидроксизину или любым производным пипразина;
• пациентам с терминальной стадией болезни почек со СКФ (Скорость клубочковой фильтрации) ниже 15 мл/мин.
Лекарственные взаимодействия
На основании фармакокинетического, фармакодинамического профиля и профиля переносимости цетиризина, не ожидается взаимодействий с другими антигистаминным препаратом. При проведении исследований лекарственных взаимодействий, в частности, с псевдоэфедрином или теофиллином (в дозе 400 мг/сутки) не было получено сообщений о фармакодинамических или значимых фармакокинетических взаимодействиях.
Алкоголь и другие вещества, унетающие ЦНС
У чувствительных пациентов одновременное применение алкоголя или других веществ, унетающих ЦНС, может привести к дополнительному снижению реакции и ухудшению производительности, хотя цетиризин не усиливает действие алкоголя (при концентрации алкоголя в крови 0,5 г/л) (см. раздел "Особые указания").
Несовместимость
Соответствующие данные отсутствуют.
Особые указания
Алкоголь
В терапевтических дозах не было продемонстрировано клинически значимых взаимодействий цетиризина с алкоголем (при уровне алкоголя в крови 0,5 г/л). Тем не менее, при одновременном приеме алкоголя рекомендуется соблюдать меры предосторожности (см. раздел "Лекарственные взаимодействия").
Повышенный риск задержки мочи
Следует соблюдать осторожность у пациентов с факторами, предрасполагающими к возникновению задержки мочи (например, поражениями спинного мозга, гиперплазией предстательной железы), поскольку применение цетиризина может увеличить риск задержки мочи (см. раздел "Побочные действия").



Пациенты с риском развития судорог
Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов с эпилепсией и у пациентов с риском развития судорог.
Кожные реакции
При прекращении применения цетиризина возможно появление зуда и/или крапивницы, даже если эти симптомы отсутствовали до начала терапии (см. раздел "Побочные действия").
В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными и могут потребовать возобновления терапии. Симптомы должны пройти при возобновлении терапии.
Дети
У детей в возрасте младше 6 лет не рекомендуется применение препарата Зиртек в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, поскольку такая форма выпуска не позволяет соответствующим образом корректировать дозу. Рекомендуется применять цетиризин в форме, подходящей для применения у детей.
Кожные аллергические пробы
Антигистаминные препараты подавляют кожные аллергические пробы, поэтому перед их выполнением рекомендуется соблюдать период отмены в течение 3 дней.
Прием пищи
Пища не влияет на степень всасывания цетиризина, однако снижает скорость всасывания.
Вспомогательные вещества
Лактоза
Препарат Зиртек таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы (лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная мальабсорбция) не следует применять данный лекарственный препарат.
Парабены
Препарат Зиртек капли для приема внутрь, раствор 10 мг/мл содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции (вероятно, замедленного типа).
Применение при беременности и в период лактации
Фертильность
Доступные данные по фертильности у человека ограничены, однако проблем, связанных с безопасностью, выявлено не было.
Данные, полученные у животных, демонстрируют отсутствие проблем, связанных с безопасностью, в отношении репродуктивной функции человека.
Беременность
При назначении препарата беременным женщинам следует соблюдать осторожность. Проспективно собранные данные по исходам беременности, во время которых применяли цетиризин, не свидетельствуют о потенциальной токсичности для организма матери или плода/эмбриона, превышающей фоновый уровень.
В исследованиях на животных не было выявлено прямого или косвенного вредного воздействия препарата в отношении беременности, развития эмбриона/плода, родов или постнатального развития.
Период лактации
Цетиризин переходит в грудное молоко. Риск побочных эффектов у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, не может быть исключен. При назначении цетиризина кормящим женщинам следует соблюдать осторожность.
Цетиризин выделяется с грудным молоком у человека в концентрациях, составляющих от 25% до 90% от измеренных в плазме значений, в зависимости от времени забора проб после приема препарата.
Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами
При применении препарата в рекомендуемой дозе 10 мг объективные измерения способности управлять транспортными средствами, латентного периода сна и производительности на сборочной линии не продемонстрировали каких-либо клинически значимых эффектов.

Однако пациенты, испытывающие сонливость, должны воздержаться от управления транспортными средствами, занятий потенциально опасными видами деятельности или работы с механизмами.
Пациенты, планирующие управлять транспортными средствами, заниматься потенциально опасными видами деятельности или работать с механизмами, не должны превышать рекомендуемую дозу и должны принимать во внимание свою реакцию на лекарственный препарат.
Передозировка
Симптомы и признаки
Симптомы, наблюдаемые при передозировке цетиризина, в основном связаны с эффектами со стороны ЦНС или с эффектами, которые могут указывать на его антихолинергическое действие.
Нежелательные явления, зарегистрированные после приема дозы, не менее чем в 5 раз превышающей рекомендуемую суточную дозу, включают: спутанность сознания, диарею, головокружение, утомляемость, головную боль, недомогание, миалгия, зуд, беспокойство, одышку, сонливость, спутор, тахикардию, тремор и задержку мочеиспускания.
Лечение
Специфический антидот для цетиризина не известен.
В случае возникновения передозировки, рекомендуется симптоматическая или поддерживающая терапия.
Проведение гемодиализа для удаления цетиризина неэффективно.
Ведение пациента должно осуществляться в соответствии с клиническими показаниями или рекомендациями национального токсикологического центра, если таковые имеются.
Форма выпуска
Зиртек таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №7
По 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блISTER) из ПВХ/фольги алюминиевой. По 1 контурной ячейковой упаковке (1 x 7) вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
Зиртек капли для приема внутрь, 10 мг/мл, 10 мл
По 10,0 мл раствора во флаконе темного стекла (тип III, Ph.Eur.), номинальной вместимостью 20,3 мл, снабженном капельницей из полипропилена низкой плотности, с белой навинчивающейся полипропиленовой крышкой с защитой от вскрытия детьми.
По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
Условия хранения
Зиртек таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №7
Зиртек капли для приема внутрь, 10 мг/мл, 10 мл
Хранить при температуре не выше 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
Зиртек таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №7
Зиртек капли для приема внутрь, 10 мг/мл, 10 мл
60 месяцев.
Не принимать после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Держатель регистрационного удостоверения:
GlaxoSmithKline Export Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS
UK
GlaxoСмитКлайн Экспорт Лимитед
980 Грейт Вест Роад, Брентфорд,
Мидлсекс, TW8 9GS
Великобритания

Производитель:
UCB Фармачин СА
Z.I. de Planchy
10 Chemin de Croix Blanche
1630 Bulle
Switzerland
Упаковки:
Aescia Pharmaceuticals S.r.l.
Via Praglia, 15
10044 Pianezza (TO)
Italy
ЮСБ Фармачин СА
Промышленная зона де Плانشи
10 Шем де Кроа Бланш
1630 Буль
Швейцария
Эйсика Фармасьютикалс С.р.л.
Виа Праглья, 15
10044 Пьянецца (Турин)
Италия
Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:
ООО «NOVOTEK»
Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, ул. Ниязбека йули, 2.
Тел.: +9987 1 206035
Мобильный телефон: +99899 8955556, +99890 3280128
Факс: +99871 1207306
E-mail: ved@novotek.uz; oax70065@gsk.com



This PDF has been verified using PitStop 12

PDF is both PDF/X-4 compliant and GSK compliant for the workflow PRODUCTION Leaflet

Version: 3

GSK

Artwork Information Panel (AIP)

Manufacturing Site Number: GSK0173D

Manufacturing Site(s): AESICA_PIANEZZA_ITALY

Product Market Trade Name: Zyrtec

Approving Market(s): Uzbekistan-UZB

Print Process: N/A

Colour Standard Reference: N/A

Technical Drawing (Do NOT include version number): T1006PIL-032-02 - 304.8 x 444/148 mm

Material Spec. (Do NOT include version number): N/A

Material Type: N/A

Total Colours & Varnishes: 1

BLACK

Total Special Finishes: 0

Body Text Size: 6.0pt

Smallest Text Size: 6.0pt

Leading: 6.5pt

Horizontal Scale: 95%

Microtext: N

Additional Info (1): N/A

Additional Info (2): N/A

Additional Info (3): N/A

AIP_Production_V_INDD - 01_2023 - Version 4

IMPORTANT

GSK LOC is responsible to approve the change documentation, artwork brief and final artwork, ensuring that it is accurate, consistent and complete.

Artwork Studio is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise SDC when changes required impact the following:
Formulation
Tablet embossing
Storage conditions
Shelf Life

NOTE TO MARKET

Local approvers must ensure that trade mark and copyright statements included in the brief comply with guidance provided by Legal: Global Trade Marks.

AESICA

Site Additional Artwork Information Panel

Production Site:
AESICA_PIANEZZA_ITALY



This colour is used for Technical Information purposes only. This information must not be printed on the final artwork.

