Version:	3			GSK
Artwork II (AIP)	nform	ation I	Panel	
Manufactur 620000000		te Num	ber:	
Manufactu GSK_WORTI	HING_L	JNITÉD I		OM
Product Ma Augmentin			ame:	
Approving MARKET GI	Marke ROUP-	t(s): Gulf and	d Near	East
Print Proce N/A				
Colour Sta N/A				
Technical [LF035				
Material Sp N/A		NOT include	version nu	mber):
Material Type: N/A		N/A		
Total Colo	ours 8	k Varni	shes:	1
BLACK				
Total Spe	cial F	inishe	s: 0	
Pody Torri	Sizo:			
6.0pt		_		
Smallest To 6.0pt	ext Siz	e:		
Leading:				

AIP Production V INDD - 01 2023 - Version 4

Horizontal Scale:

Additional Info (1):

Additional Info (2):

Additional Info (3):

100%

N/A

N/A

≝ N/A

Microtext:

Local approvers must ensure that trade mark and copyright statements included in the brief comply with guidance provided by Legal: Global Trade Marks.

IMPORTANT

GSK LOC is responsible to approve the change documentation, artwork brief and final artwork, ensuring that it is accurate, consistent and complete.

Artwork Studio is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise SDC when changes required impact the following:

Formulation Tablet embossing **Storage conditions** Shelf Life

PHARMA CODE N° 4644



e-Banner

Document: PPC-0032724

Operator: MNB13223



Augmentin 375 mg and 625 mg Tablets

Project: CO-0059550

Site Code: 62000000090957







- What is in this leaflet

 What Augmentin is and what it is used for
 What you need to know before you take Augmentin

- · urinary tract infections

- · respiratory tract infections
- urinary tract infections skin and soft tissue infections including dental infections

· bone and joint infections.

- Do not take Augmentin:

 if you are allergic to amoxicillin, clavulanic acid, penicillin or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)

 if you have ever had a severe allergic reaction to any other antibiotic. This can include a skin rash or swelling of the face or
- if you have ever had liver problems or jaundice (vellowing of the skin) when taking an antibiotic

- In some cases, your doctor may investigate the type of bacteria that is causing your infection. Depending on the results, you may be given a different strength of Augmentin or a different medicine.

Augmentin can have side effects and the symptoms may make you unfit to drive.

Augmentin contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially 'sodium-free'

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are

Adults and children weighing 40 kg and over

Amoxicillin trihydrate and Potassium clavulanate

- side effects not listed in this leaflet. See section 4.

- How to take Augmentin
 Possible side effects
- 5 How to store Augmentin 6 Contents of the pack and other information

1 What Augmentin is and what it is used for

Augmentin is an antibiotic and works by killing bacteria that cause infections. It contains two different medicines called amoxicillin and clavulanic acid. Amoxicillin belongs to a group of medicines called "penicillins" that can sometimes be stopped from working (made inactive). The other active component (clavulanic acid) stops this from happening. Augmentin 375mg tablets is used in adults and children to treat the following infections:

- sinus infections
- skin infections
 dental infections.

 Augmentin 625mg tablets is used in adults and children to treat the following infections:
- middle ear and sinus infections

2 What you need to know before you take Augmentin

- → Do not take Augmentin if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before
- Warnings and precautions
 Talk to your doctor or pharmacist before taking Augmentin if you:
- have glandular fever
- nave glandular rever
 are being treated for liver or kidney problems
 are not passing water regularly.
 If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist before taking Augmentin.

Conditions you need to look out for Augmentan or a different inedicate.

Augmentin can make some existing conditions worse, or cause serious side effects. These include allergic reactions, convulsions (fits), chest pain and inflammation of the large intestine. You must look out for certain symptoms while you are taking Augmentin, to reduce the risk of any problems. See 'Conditions you need to look out for' in section 4.

Blood and urine tests

If you are having blood tests (such as red blood cell status tests or liver function tests) or urine tests (for glucose), let the doctor or nurse know that you are taking Augmentin. This is because Augmentin can affect the results of these types of tests.

- Other medicines and Augmentin

 Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or might use any other medicines.

 If you are taking allopurinol (used for gout) with Augmentin, it may be more likely that you will have an allergic skin reaction.

 If you are taking probenecid (used for gout), your doctor may decide to adjust your dose of Augmentin.

 If medicines to help stop blood clots (such as warfarin) are taken with Augmentin then extra blood tests may be needed.

 Augmentin can affect how methotrexate (a medicine used to treat cancer or rheumatic diseases) works.
- Augmentin may affect how mycophenolate mofetil (a medicine used to prevent the rejection of transplanted organs) works.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. Driving and using machines

Do not drive or operate machinery unless you are feeling well

Version: 5

1 tablet three times a day

Children weighing less than 40 kg
Children aged 6 years or less should preferably be treated with Augmentin oral suspension. Augmentin tablets are not

Patients with kidney and liver problems

- Ask your doctor or pharmacist for advice when giving Augmentin tablets to children weighing less than 40 kg. The tablets are not suitable for children weighing less than 25 kg.
 If you have kidney problems the dose might be changed. A different strength or different medicine may be chosen by your doctor.
 If you have liver problems you may have more frequent blood tests to check how your liver is working.
- Swallow the tablets whole with a glass of water.
 Tablets can be broken along the score line to make them easier to swallow. You must take both pieces of the tablet at the
- Space the doses evenly during the day, at least 4 hours apart. Do not take 2 doses in 1 hour.

Date/Time Created: 26.Feb.2024 11:49 GMT

Do not take Augmentin for more than 2 weeks. If you still feel unwell you should go back to see the doctor.

If you take more Augmentin than you should

If you take too much Augmentin, signs might include an upset stomach (feeling sick, being sick or diarrhoea) or convulsions.

Talk to your doctor as soon as possible. Take the medicine carton or bottle to show the doctor.

If you forget to take Augmentin

If you forget to take a dose take it as soon as you remember.

You should not take the next dose too soon, but wait around 4 hours before taking the next dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Augmentin
Keep taking Augmentin until the treatment is finished, even if you feel better. You need every dose to help fight the infection. If
some bacteria survive they can cause the infection to come back.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. The side effects below may happen Conditions you need to look out for

- skin rash
 inflammation of blood vessels (vasculitis) which may be visible as red or purple raised spots on the skin, but can affect other parts of the body
- perice of the body fever, joint pain, swellen glands in the neck, armpit or groin swelling, sometimes of the face or throat (angioedema), causing difficulty in breathing

collapse.
 chest pain which can be a sign of a potentially serious allergic reaction called Kounis syndrome
 → Contact a doctor immediately if you get any of these symptoms. Stop taking Augmentin.
 Inflammation of large intestine
 Inflammation of the large intestine, causing watery diarrhoea usually with blood and mucus, stomach pain and/or fever.
 → Contact your doctor as soon as possible for advice if you get these symptoms.

Very common side effects
These may affect more than 1 in 10 people

These may affect up to 1 in 10 people

thrush (candida - a yeast infection of the vagina, mouth or skin folds)

- feeling sick (nausea), especially when taking high doses
 if affected take Augmentin with a meal diarrhoea (in children)
- These may affect up to 1 in 100 people

 skin rash, itching
- raised itchy rash (hives)

Uncommon side effects

- dizziness
 headache.
 Uncommon side effects that may show up in your blood tests: increase in some substances (enzymes) produced by the liver

Rare side effects

- These may affect up to 1 in 1000 people

 skin rash, which may blister, and looks like small targets (central dark spots surrounded by a paler area, with a dark ring around the edge erythema multiforme)

 if you notice any of these symptoms contact a doctor urgently.
- you house any of these symptoms contact a doctor
 Rare side effects that may show up in your blood tests:
 low number of cells involved in blood clotting
 low number of white blood cells.
 Frequency not known
 Frequency cannot be estimated from the available data.
- Allergic reactions (see above)
- Inflammation of the large intestine (see above)
 Inflammation of the protective membrane surrounding the brain (aseptic meningitis)
- - Serious skin reactions:
 a widespread rash with blisters and peeling skin, particularly around the mouth, nose, eyes and genitals (Stevens-Johnson syndrome), and a more severe form, causing extensive peeling of the skin (more than 30% of the body surface - toxic

- widespread red skin rash with small pus-containing blisters (bullous exfoliative dermatitis)
- widesplead red skill fash with shall puz-containing bilisters (builds excluded extinually).

 flu-like symptoms with a rash, fever, swollen glands, and abnormal blood test results (including increased white blood cells (eosinophilia) and liver enzymes) (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)).

- Contact a doctor immediately if you get any of these symptoms.
 inflammation of the liver (hepatitis)
 jaundice, caused by increases in the blood of bilirubin (a substance produced in the liver) which may make your skin and whites of the eyes appear yellow
- inflammation of tubes in the kidney
- blood takes longer to clot
- hyperactivity
 convulsions (in people taking high doses of Augmentin or who have kidney problems)
- black tongue which looks hairy
 Side effects that may show up in your blood or urine tests:
- severe reduction in the number of white blood cells

low number of red blood cells (haemolytic anaemia crystals in urine. Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

To report Product Complaint/s or Adverse Event/s associated with the use of GSK product/s, please contact us via:

gulf.safety@gsk.com.

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
 Do not use this medicine after the expiry date (EXP) which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of
- store in a dry place at or below 30°C.
- Store in the original package in order to protect from moisture.

 Tablets in desiccated pouch packs should be used within 14 days of opening.
- Do not use if the tablets are chipped or damaged.

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment. 6 Contents of the pack and other information
- What Augmentin contains Augmentin 625 mg The active substances are amoxicillin and clavulanic acid. Each tablet contains amoxicillin trihydrate equivalent to 500 mg amoxicillin and potassium clavulanate equivalent to 125 mg of clavulanic acid.

 Augmentin 375 mg The active substances are amoxicillin and clavulanic acid. Each tablet contains amoxicillin trihydrate equivalent to 250 mg amoxicillin and potassium clavulanate equivalent to 125 mg of clavulanic acid.
- The other ingredients are: Tablet core magnesium stearate, sodium starch glycolate type A, colloidal anhydrous silica, microcrystalline cellulose. Film coat titanium dioxide (E171), hypromellose, macrogol (4000, 6000) and silicone oil

What Augmentin looks like and contents of the pack Augmentin 625 mg film-coated tablets are white to off-white, oval shaped tablets debossed with "AC" and a scoreline on one side. Augmentin 375 mg film-coated tablets are white to off-white, oval shaped tablets debossed with "AUgmentin" on one side. Augmentin 375 mg film-coated tablets are white to off-white, oval shaped tablets debossed with "Augmentin" on one side. They are packaged in blister packs inside a pouch, enclosed in a carton. The pouch contains a desiccant sachet. The desiccant must be kept inside the pouch and must not be eaten.

SmithKline Beecham Limited*

Worthing, United Kingdom

*Member of the GlaxoSmithKline group of companies

This leaflet was last approved on 16 May 2023.

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies © 2024 GSK group of companies or its licensor.

Advice/medical education

Antibiotics are used to treat infections caused by bacteria. They have no effect against infections caused by viruses.

Sometimes an infection caused by bacteria does not respond to a course of an antibiotic. One of the commonest reasons for this to occur is because the bacteria causing the infection are resistant to the antibiotic that is being taken. This means that they can survive and even multiply despite the antibiotic.

they can solve and even multiply despite the artibiotic. Bacteria can become resistant to antibiotics for many reasons. Using antibiotics carefully can help to reduce the chance of bacteria becoming resistant to them.

When your doctor prescribes a course of an antibiotic it is intended to treat only your current illness. Paying attention to the

It is very important that you take the antibiotic values at the right dose, at the right times and for the right number of days. Read the instructions on the label and if you do not understand anything ask your doctor or pharmacist to explain.

2. You should not take an antibiotic unless it has been prescribed specifically for you and you should use it only to treat the infection for which it was prescribed. 3. You should not take antibiotics that have been prescribed for other people even if they had an infection that was similar to

yours. 4. You should not give antibiotics that were prescribed for you to other people. 5. If you have any antibiotic left over when you have taken the course as directed by your doctor you should take the remainder

This is a Medicament Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.


Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. Keep all medicaments out of reach of children.

to a pharmacy for appropriate disposal.

Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists

PAGE 3 PAGE 1 PAGE 2

This PDF has been verified using PitStop 12 Page 1 of 2 PDF is both PDF/X-4 compliant and GSK compliant for the workflow PRODUCTION Leaflet



AIP Production V INDD - 01 2023 - Version 4

Local approvers must ensure that trade mark and copyright statements included in the brief comply with guidance provided by Legal: Global Trade Marks.

IMPORTANT

GSK LOC is responsible to approve the change documentation, artwork brief and final artwork, ensuring that it is accurate, consistent and complete.

Artwork Studio is responsible fo site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise SDC when changes required impact the following:

Formulation Tablet embossing Storage conditions **Shelf Life**

ردود فعل الجلد الخطيرة:

. طفح جلدي واسع النطاق مع ظهور بثور و تقشير الجلد، خاصة حول الفم والأنف والعينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز - جونسون) وشكل أكثر حدة يسبب تقشير البشرة على نطأق واسع (أكثر من ٢٠٪ من مساحة سطح الجسم) (والتقشر السمى للأنسجة السطحية الميئة) طفح جلدي أحمر واسع النطاق مع ظهور فقاعات صخيرة تحتوى على صديد (التهاب الجلد التقشري الفقاعي)

- طفح جلدي أهمر متقفر مع نتوءات تمت الجلد و فقاعات (داء البثور ذو الطفح الجلدي الظاهر) - أعراض شبيهة بالإنقلونزا مع طفح جلدي وحمى وغدد متنفخة ونتلاج غير طبيعية لتحليل الدم (بما في ذلك زيادة مستويات خلايا الدم البيضاء إفرط الحمضات] وأنزيمات الكبد) (تفاعل الدواء مع فرط الحمضات وأعراضٌ جهازية "DRESS").

◄ اتصل بالطبيب على الفور في حالة حدوث أي من هذه الأعراض الجانبية لك. التهاب الكبد (الالتهاب الكبدى) اليرقان الناجم عن زيادة البيليروبين (مادة ينتجها الكبد) في الدم، مما قد يؤدي إلى إصفر ار جلدك ومناطق العين البيضاء

التهاب الأنابيب الكلوية

 فرط النشاط النوبات (التشنجات) (عند الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من أوجمنتين أو لديهم مشاكل في الكلي)

> الآثار الجانبية التي قد تظهر في فحوصات الدم أو البول: انخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضا

انخفاض عدد خلایا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالی)

. برب استشارة الطبيب أو الصيدلاني إذا تعرّضت لأي من الأثار الجانبية. ويشمل ذلك أية أثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. فمن خلال الإبلاغ عن الأثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة ًهذا الدواء. من الجل تسجيل شكوي بخصوص الدواء او اعراض جانبية مرتبطه باستخدام دواء شركه GSK برجاء التواصل عبر qulf.safety@qsk.com

> أحتفظ بهذا الدواء بعدا عن مرئي ومتناول الأطفال. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة بعد كلمة "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المحدد

 يُخزن في مكان جاف عند أو أقل من ٣٠ ° مئوية.
 يُخزن في العبوة الأصلية لحمايته من الرطوبة. يجب استَّخدام الأقراص المتوفرة في عبوات أغلفة مجففة خلال ١٤ يومًا من فتحها

• لا تستخدم الدواء إذا كانت الأقراص متكسرة أو تالغة لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء عند التوقف عن استخدامه ميث أنك بذلك تساهم في حماية البيئة.

أوجمنتين ٣٥٥ ملغ. المواد الفعالة هي أموكميسيلين وحمض الكلافو لانيك. يحتوي كل قرص على أموكميسيلين ثلاثي الهيدرات ما يعادل ٢٥٠ ملجم أموكميسيلين وكلافيولينات

لبوتاسيوم ما يعادل ١٢٥ ملجم حمض الكلافو لانيك. • المكونات الأخرى هي: نواة القرص – ستيار اتالماغنيسيوم، وجليكو لات نشا الصوديوم النوع أ، والسيليكا اللامانية الغروية وسليلوز دقيق التبلور . غشاء القرص الرقيق – ثاني أوكسيد التَايِتَانيوم (E 171)، وهاييرمالوز، وماكروجيل (٢٠٠٠، ٢٠٠٠)، وزيت السيليكون (دايميتيكون).

شكل أقراص أوجمنتين ومحتويات العبوة ا أقراص أوجنتين ٢٥٠ محم المنطقة هي أقراص ذات لون أبيض إلى أبيض مصفر، ذات شكل بيضاري منقوش عليها "Na" وخط على جلنب واحد. أقراص أوجنتين ٢٥٥ مجم المنطقة هي أقراص ذات لون أبيض إلى أبيض مصفر، ذات شكل بيضاري ومكتوب عليها كلمة "أوجنتين" على جانب واحد. وهي معبأة في شرائط داخل

اكيَّاس ومعباة في علبة كرتون. وتحتويّ الأكياس على مجَّففُ معباً داخل أكيّاس صغيرة. يجب الإبقاء علّي كيسٌ المجفف داخل العبوة ولا يجبّ أكله. الشركة المصنعة:

*SmithKline Beecham Limited Worthing, United Kingdom عضو مجموعة شركات * GlaxoSmithKline

تمت الموافقة عليه في ١٦ مايو ٢٠٢٣. العلامات التجارية مملوكة أو مرخص بها لمجموعة شركات جلاكسوسميث كلاين (GSK).

© ۲۰۲٤ مجموعة شركات جلاكسوسميث كلاين (GSK) أو مرخصها.

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية. وتعد هذه المضادات غير فعالة ضد الالتهابات الفيروسية. في بعض الأحيان لا تستجيب الحدرى البكتيرية للعلاج بالمضادات الحيوية. ويعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لذلك هو أن البكتيريا المسببة للعدوى تقاوم المضادات الحيوية المستخدمة. ويعنى هذا أن البكتريا بمكن أن تنقى حية وأيضا تتكاثر وغو تناول المضادات الحيوية

ن . ترب الكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لعدة أسباب. ويمكن للاستخدام الحذر للمضادات الحيوية أن يساعد في تقليل خطر أن تصبح البكتيريا مقاومة لها. عندما يصف ألك طبيبك العلاج باستخدام المضادات الحيوية، فإن هذا فقط لغرض علاج حالتك الحالية. وتساعد النصائح التالية على منع ظهور البكتيريا المقارمة التي قد تمنع عمل '- من المهم جدًّا أن تتناول المصاد الحيوي بالجرعة المناسبة وفي الأوقات المناسبة وللمدة المناسبة. إقرأ التطيمات على الملصق واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كنت لا تفهم شيئًا ما من ذلك.

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيادلة العرب

'- يجب أن لا تتناول المضادات الحيوية إذا لم تكن موصوفة لك تحديدا ويجب عليك استخدامها فقط لعلاج العدوى الموصوفة من أجلها. ٣- يجب ألا تأخذ أي مضادات حيوية موصوفة الأشخاص أخرين حتى لو كانوا مصابين بعدوي مماثلة التي عندك. ٤- لا ينبغي عليك إعطاء المضادات الحيوية التي وصفت لك لأشخاص أخرين.

٥- إذا تبقى أيًا من المصادات الحيورية بعد أنتهاء العلاج وفقًا لتوجيهات الطبيب، فيجب أن تأخذ المضادات الحيورية غير المستخدمة إلى صيدلية للتخلص منها بشكل صحيح.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر اتبع بدقة وصفة الطُّبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء و بنفعه و ضرره. لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب. لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال. البالغون والأطفال بوزن ٤٠ كجم فما فوق

و قرص واحد ثلاث مرات بومياً الأطفالُ الَّذينَ يزنون أقلُ من ٠ ، كجم

الأطفال الذين يبلغون من العمر ٦ سنوات فأقل يُفضل أن يتم علاجهم بأوجمنتين شراب. لا ينصح بأعطائهم أقراص أوجمنتين. لمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الكبد

أسال طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة عند إعطاء أقراص أوجمنتين الأطفال الذين يقل وزنهم عن ٤٠ كجم. الأقراص غير مناسبة للأطفال وزنهم أقل من ٢٥ كجم. · إذا كنت تعانى من مشاكَّل في الكلى، فقد يتم تعديل الجرعة. وقد يختار الطبيب تركيزات أخرى أو دواءً آخر. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد، فقد يتم إخضاعك للعديد من فحوصات الدم لمراقبة وظائف الكبد. كيف تأخذ أوجمنتين

> · يؤخذ مع الطعام ابلع الأقراص كاملة مع كوب ماء.

جي مرس سند علي ويد المدر. و يمكن كمر الأقراص على طول الخط المحدد لتسهيل بلمها. يجب عليك نتاول قطعتي القرص في نفس الوقت. • تناول الجرعات على فترات زمنية متساوية على مدار اليوم بفترة لا تقل عن ؛ ساعات بين كل جرعة وأخري. ولا تأخذ جرعتين خلال ساعة واحدة.

 لا تستخدم أوجمنتين لأكثر من أسبوعين إذا لم تشعر بتحس يجب أن تراجع طبيبك مرة أخرى. ذا استخدمت جرعة أوجمنتين أكثر مما يجب

إذا كنت قد أخذت كمية كبيرة من الأوجمنتين، فقد تشمل الأعراض مشاكل في المعدة (الشعور أو الاحساس بالتعب أو الإسهال) أو نوبات تشنج عصبي. اتصل بطبيبك في أقرب وقت مكن. خذ علبة أو زجاجة الدواء معك لعرضها على الطبيب. إذا نسيت استخدام أوجمنتين

إذا نسيت أخذ الجرعة، قم بأخذها بمجرد أن تتذكر. لا يجبُ أن تتناول الجرعة التالية سريعاً، حيث يجب تناولها بعد الانتظار لمدة ؛ ساعات. إذا نسيت تناول جرعة وتذكرت ذلك لا تضاعف الجرعة عند تناولها. ذا توقفت عن تناول أوجمنتين

استمر في أخذ أوجمتنين حتى ينهاية فترة العلاج، حتى إذا شعرت بتحسن، حيث أنك تحتاج إلى كل الجرعات الموصوفة لمحاربة الحرى، لأنه إذا بقيت بعض البكتيريا، فإنها يمكن أن

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي المختص.

غل جميع الأدوية، قد يتسبب هذا الدواء في ظهور أعراض جانبية، وذلك على الرغم من عدم حدوثها مع الجميع. من المحتمل ظهور الأعراض الجانبية التالية عند استخدام هذا الدواء. لحالات التي بجب أن تنتبه البها ردود الفعل الناتجة عن الحساسية:

طفح جلدي التهاب الأرعبة الدموية (التهابات الوعائي التحسسي)، والذي قد تظهر على شكل بقع حمراء أو أرجوانية مرتفعة عن الجلد، ولكنه قد يؤثر أيضا على مذاطق أخرى من الجسم.

 تورم، في بعض الأحيان على الوجه أو الحلق (وذمة وعائية) مما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي · ألم في الصدر يمكن أن يكون علامة على رد فعل تحسسي خطير محتمل يسمى متلازمة كونيس

€ اتصل بالطبيب على الفور في حالة ظهور أي من هذه الأعراض عليك. توقف حينها عن استخدام أوجمنتين. التهاب القولون (الأمعاء الغليظة) التهاب القولون الذي يسبب الإسهال المائي، والمصحوب عادة بالدم والمخاط، وآلام في المعدة و/أو الحمى.

◄ اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن للحصول على المشورة إذا عانيت من هذه الأعراض. ثار جانبية شانعة جدا

قد تحدث لأكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص ثار حانبية شانعة

قد تحدث لـ ١ من كل ١٠ أشخاص العدوى الفطرية (المبيضة - عدوى الخميرة في منطقة المهبل أو الفم أو ثنيات الجلد) الغثيان، خاصة عند تناول جر عات عالية

◄ إذا كان اأأمر كذلك يجب تناول أوجمنتين مع الطعام.

 القيء
 الإسهال (في الأطفال). آثار جانبية غير شانعة قد تحدث لـ ۱ من کل ۱۰۰ شخحص طفح جلدي، حكة

· طفح جلدي مرتفع (قشعريرة)

الأعراض الجانبية غير الشانعة التي قد تظهر في فحوصات الدم: زيادة بعض المواد (الإنزيمات) التي يفرزها الكبد.

عارض جانبية نادرة قد تحدث لـ ۱ من كل ١٠٠٠

ا طفح جادي، ربما مع ظهور فقاعات تشبه الأهداف الصغيرة (بقعة مظلمة مركزية مع منطقة شاحبة محيطة وحلقة مظلمة حولها - حمامي متعددة الأشكال)

الآثار الجانبية النادرة التي قد تظهر في فحوصات الدم: انخفاض عدد الخلايا المشاركة في تخثر الدم انخفاض عدد خلابا الدم البيضاء

آثار جانبية غير معروف تكرارها لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة. الحساسية (انظر أعلاه) · التهاب القولون (انظر أعلاه)

· التهاب الغشاء الواقي حول المخ (التهاب السحايا)

شرة العبوة: معلومات للمستخدم



GSK

ثلاثى هيدرات الأموكسيسللين - كلافيولينات البوتاسيوم اقرأ هذه النشرة كاملةً بعناية قبل بدء استخدام هذا الدواء لأحتوانها على معلومات مهمة لك.

احتفظ بهذه النشرة. فربما ترغب في إعادة قراءتها لاحقًا.
 إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

• لقد تم وصف هذا الدواء لك (أو لطفاك) فقط. لا تصف هذا الدواء للأخرين حيث يمكن أن يسبب لهم ضررا، حتى لو كان لديهم نفس أعراض مرض طفاك. إذا واجهت أي أثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضًا على الأثار الجانبية غير المدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات النشرة ١- ما هو أوجمنتين وما هي دواعي استعماله؟ - ما الذي يجب عليك الانتباه إليه قبل استخدام أوجمنتين؟ ٣- كيفية استخدام أوجمنتين؟ ٤- ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟ ٥- كيفية تخزين أوجمنتين؟

أوجمنتين هو مضاد حيوي يعمل من خلال قتل البكتيريا الممسببة للحدوى. ويحتوي على اثنين من المكونات النشطة المختلفة هما أموكميسيللين وحمض كلافيو لانيك. ينتمي أموكميسيللين إلى مجموعة من الأدوية تسمى "البنسلين" والتي قد تصبح في بعض الأحيان غير نشّطة (خاملة)، إلا أن العنصر النشط الثاني (حمض كالفيو لانيك) يمنع هذا. ستخدم أوجمنتين ٦٢٥ ملجم مع البالغين والأطفال لعلاج حالات العدوي التالية:

- محتويات النشرة والمعلومات أخرى

عدوى الأذن الوسطي والجيوب الأنفية

عدوى الجهاز التنفسي و"
 عدوى المسالك البولية

عدوى الجلد الأنسجةُ الرخوة بما في ذلك عدوى الأسنان عدوى العظام والمفاصل يستخدم أوجمنتين ٣٧٥ ملجم البالغين والأطفال لعلاج حالات العدوى التالية:

 عدوى الجيوب الأنفية عدوى المسالك البولية

• عدوى الجلد عدوى الأسنان

٢- ما الذي يجب عليك الانتباه إليه قبل لا تأخذ أوجمنتين في الحالات التالية:

 إذا كان لديك حساسية من مواد الأموكسيسيللين أو حمض كلافيو لانيك أو البنسلين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (انظر القائمة في القسم ٦). • إذا كان قد حدث لك في أي وقت أي رد فعل شديد يتعلق بالحساسية لأي مضاد حيوي أخر. وهذا قد يظهر على شكل طَفح أو تورم في الوجّه أو الحلّق.

اذا عانيت في أي وقت مضي من مشكلات في الكبد أو البرقان (إصفر أر الجلد) في حالة تناولك المضادات الحبوية

🗲 لا تستخدم أوجمنتين إذا كان أي من هذه الأعراض تنطبق عليك. تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أوجمنتين إذا لم تكن متأكدًا.

التحذيرات والإحتياطات تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أوجمنتين إذا كنت:

مصاب بحمى الغدية
 تُعالج من مشاكل في الكبد أو الكلى

تتبول بشكل غير منتظم.

إذا لم تكن متأكدًا ممّا إذا كنت تعانى من أي من هذه الأعراض أم لا تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أوجمنتين.

في بعض الحالات قد يبحث طبيبك عن نوع البكتيريا التي تسبب لك العدوى. واعتمادًا على النتائج قد يتم إعطانك تركيز آخر من أوجمنتين أو أعطانك دواء آخر. يمكن لأوجمنتين أن يفاقم الحالات الراهنة أو أن بؤدي إلى حدوث أثار جانبية خطيرة. ويتضمن هذا ردود فعل ناتجة عن الحساسية، والتتشجات (النوبات)، ألم في الصدر والتهاب القولون.

يَجِب الأنتباه لأعراض محددة أثناء تناولك أوجمنتين، وذلك لتقليل مخاطر أي مشاكل. أنظر " الحالات التي يجب الانتباه إليها" في القسم ٤.

هذا أمر ضروري لأن أوجمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج هذه الفحوصات.

تناول أوجمنتين مع الأدوية الأخرى أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تنوى تناول أي أدوية أخرى، أو أن تكون قد تناولت أي أدوية أخرى في الأونة الأخيرة.

إذا كنت تتناول الوبيورينول (بستخدم لعلاج الفترس) مع عقار أرجمنتين، فهنك احتمالية لحدوث حساسية جلد كرد فعل.
 إذا كنت تأخذ بروبينسيد (لعلاج النفرس) فقد يقرر طبيبك تحديل جرعة الأوجمنتين لك.

إذكات تسخير المراجع الراجع المراجع المرا

 قد يُؤثّر الأوجمنتين على كيفية عمل الميكوفينولات موفيتيل (دواء يستخدم لمنع رفض الأعضاء المزروعة). الحمل والرضاعة والخصوية

إذا كننب حاملًا أو مرضعة أو تعتقدين أنكِ حاملًا أو تخططين لإنجاب طفل، فاستشيرى طبيبكِ أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. التأثير على القدرة علي القيادة وتشعيل الآلات قد يسبّب أوجمنتين آثارًا جانبية وقد تجعلك الأعراض غير قادرالقيادة. لا نقم بالقيادة و استخدام الماكينات، إذا شعرت بعدم الارتياح.

حتوي أوجمنتين على الصوديوم يحتوي هذا الدواء على أقل من ١ مليمول صوديوم (٢٣ ملغ) لكل قرص، أي يعتبر بشكل أساسي "خال من الصوديوم".

استخدم دائمًا هذا الدواء وفقا للإرشادات الدقيقة للطبيب أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إن لم تكن متأكد.

6200000

PAGE 4 PAGE 5 PAGE 6

This PDF has been verified using PitStop 12 PDF is both PDF/X-4 compliant and GSK compliant for the workflow PRODUCTION Leaflet

