

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| e-Banner | Project: CO-0043656 | Document: PPC-0027503 | Version: 3 |
| | Site Code: 1200000116058 | Operator: KA173176 | Date/Time Created: 06.Sep.2021 18:27 GMT+1 |

Front Page

1200000116058

Package Leaflet: Information for the user



Dermovate Scalp Application

clobetasol propionate

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

- What Dermovate is and what it is used for
- What you need to know before you use Dermovate
- How to use Dermovate
- Possible side effects
- How to store Dermovate
- Contents of the pack and other information

1. What Dermovate is and what it is used for

Dermovate Scalp Application (called 'Dermovate' in this leaflet) contains a medicine called clobetasol propionate. It belongs to a group of medicines called steroids. It helps to reduce swelling and irritation. Dermovate is used to help reduce the redness and itchiness of certain scalp problems. These include frequently relapsing dermatoses and psoriasis that have not responded to milder steroid creams, ointments, lotions or scalp applications.

2. What you need to know before you use Dermovate

Do not use Dermovate:

- if you are allergic (hypersensitive) to clobetasol propionate or any of the other ingredients of this medicine (listed in Section 6)
- if you have a skin infection on your scalp
- on a child under 1 year of age.

Do not use if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before using Dermovate.

Warnings and precautions

- Talk to your doctor or pharmacist before using your medicine if:
 - you experience newly developed bone pain or worsening of previous bone symptoms during a treatment with Dermovate especially if you have been using Dermovate for a prolonged time or repeatedly,
 - you use other oral/topical medication containing corticosteroids or medication intended to control your immune system (e.g. for autoimmune disease or after a transplantation). Combining Dermovate with these medicines may result in serious infections.
 - you have previously had an allergic reaction with another steroid.
 - you are applying the liquid under an airtight dressing. These dressings make it easier for the active ingredient to pass through the skin. It is possible to accidentally end up using too much. Do not bandage or otherwise cover the treated scalp area, unless directed to do so by your doctor.
 - If directed to cover the treated area with a dressing, make sure that the skin is cleansed before a fresh dressing is applied to prevent infections.
 - you have psoriasis, your doctor will want to see you more often.
 - you are applying the liquid to broken, damaged or thin skin.
 - you are applying to a large surface area.

Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances.

If an infection develops during the use of this medicine talk to your doctor or pharmacist.

Be very careful not to get the liquid in your eyes.

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist before using this medicine.

Children

- Do not use this medicine on a child under the age of 1 year.
- Avoid continuous treatment for a long period of time in children over the age of 1 year, as their skin is thinner than adults and as a result may absorb larger amounts.
- Use on children should be limited to a few days and reviewed weekly.
- Dressings or bandages should not be used on children where the scalp application is applied.

Other medicines and Dermovate

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicine, especially if you are taking ritonavir and itraconazole medications.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or are breast-feeding, think you may become pregnant or are planning to have a baby ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine

3. How to use Dermovate

Always use this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Using this medicine

- You usually put Dermovate on your scalp in the morning and at night. This may be reduced as your scalp problem begins to get better, or stopped when it is better.
- For use on your skin of your scalp only.
- Do not use it more often than prescribed or use it for a long time (such as every day for many weeks or months). If you need treatment for a long time, your doctor may decide you need to use a milder treatment.
- The germs that cause infections like warm and moist conditions under dressings. If directed to cover the treated area with a dressing, always clean the skin before a fresh dressing is put on to help prevent infection of the skin beneath the dressing.
- Be very careful not to get the liquid in your eyes. Do not touch your eyes until you have washed your hands.
- If you wash or shampoo your hair it should be dried before applying the liquid.
- If you are applying the scalp application on someone else make sure you wash your hands after use or wear disposable plastic gloves.
- This product is flammable. Keep the liquid away from open fire and flames and all sources of ignition, including smoking, during application and immediately after you've used it.**
- Do not dry your hair with a hairdryer.**

Guidance on how to apply the liquid

- Wash your hands.
- Unscrew the bottle cap and place the nozzle directly on the scalp that needs treating.
- Gently squeeze the bottle to cover the area with a thin and even layer of liquid.
- You can rub this liquid in, but you don't have to. Your scalp will feel cool until the liquid has dried.
- Wash your hands again.
- Do not exceed the prescribed amount.

Use in children

- Do not use this medicine on children under 1 year of age.
- It is especially important in children not to exceed the prescribed amount.
- A course of treatment for a child should not normally last more than a few days, unless your doctor has told you to use it for longer. The doctor may want to see the child every week whilst using Dermovate scalp application.

If you use more Dermovate than you should

If you apply too much or if accidentally swallowed, it could make you ill. Talk to your doctor or go to hospital as soon as possible.

If you forget to use Dermovate

If you forget to apply your scalp application, apply it as soon as you remember. If it is close to the time you are next meant to apply it, wait until this time.

Do not apply extra Dermovate to make up for a missed dose.

If you stop using Dermovate

If you use Dermovate regularly make sure you talk to your doctor before you stop using it as your condition may get worse if stopped suddenly. If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop using Dermovate and tell your doctor immediately if:

- you find that your scalp problem gets worse, you develop a generalised rash or your skin becomes swollen during treatment. You may be allergic to the scalp application, have an infection or need other treatment.
- you have psoriasis and get raised bumps with pus under the skin. This can happen during or after the treatment and is known as pustular psoriasis.

Other side effects you may notice when using Dermovate include:

- Common (may affect up to 1 in 10 people)**
 - a feeling of burning, pain, irritation or itching where the scalp application is applied.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

- skin thinning, this may cause stretch marks
- blood vessels under the surface of your skin may become more noticeable.

Very Rare (may affect up to 1 in 10,000 people)

Use of Dermovate for a long period of time, or use under an airtight dressing, may cause the following symptoms:

- increased weight
- moon face, rounding of the face
- obesity
- skin thinning
- skin wrinkling
- skin dryness
- changes to the colour of your skin
- increased body hair
- hair loss/lack of hair growth/damaged looking hair

Other very rare skin reactions that may occur are:

- allergic reaction at the site of application
- worsening of condition
- application site irritation/pain
- redness
- rash or hives
- if you have psoriasis you may get raised bumps with pus under the skin.
- This can happen very rarely during or after treatment and is known as pustular psoriasis
- skin infection
- acne

In children, also look out for the following symptoms:

- delayed weight gain
- slow growth

Very rare side effects that may show up in blood tests or when your doctor gives you a medical examination:

- a decrease in the level of the hormone cortisol in your blood
- increased levels of sugar in your blood or urine
- high blood pressure
- cloudy lens in the eye (cataract)
- increased pressure in the eye (glaucoma)
- vision problems caused by detachment of the retina in the eye (central serous chorioretinopathy)
- weakening of the bones through gradual loss of mineral (osteoporosis);
- additional tests may be needed after your medical examination to confirm if you have this condition

Not Known (frequency cannot be estimated from the available data)

blurred vision

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. To report Product Complaint/s or Adverse Event/s associated with the use of GSK product/s, please contact us via: gulf.safety@gsk.com. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Dermovate

- Keep out of the reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the bottle label or carton after (EXP). The expiry date refers to the last day of that month.
- Do not store above 25°C.
- Do not use this bottle for more than 3 months after first opening it.
- Keep the container tightly closed when not in use. Contents are flammable. Keep away from all sources of fire, flame and heat. Do not leave in direct sunlight.
- Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Dermovate contains

- The active ingredient is clobetasol propionate. Each 1 g contains 0.5 mg of clobetasol propionate (0.05% w/w).
- The other ingredients are carbomer, isopropyl alcohol, sodium hydroxide and purified water

What Dermovate looks like and contents of the pack

Within each carton is a specially designed plastic bottle with a nozzle and cap that contains 25 ml of a sticky liquid.

Manufacturer:

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Germany

This leaflet was last revised in 22 March 2021.

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies. ©2021 GSK group of companies or its licensor.

THIS IS A MEDICAMENT

Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.

- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of the reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| Version: 1 | | | |
| Harmony AMS Artwork Information Panel | | | |
| Manufacturing Site Number: 1200000116058 | | | |
| Manufacturing Site(s): ASPEN_BAD OLDESLOE_GERMANY | | | |
| Product Market Trade Name: Dermovate | | | |
| Approving Market(s): MARKET GROUP-Gulf and Near East | | | |
| Print Process: N/A | | | |
| Colour Standard Reference: N/A | | | |
| Technical Drawing (Do NOT include version number): BE07_148X297 | | | |
| Material Spec. (Do NOT include version number): N/A | | | |
| Material Type: N/A | | N/A | |
| Total Colours & Varnishes: 1 | | | |
| BLACK | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Special Finishes: 0 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Body Text Size: 6.0pt | | | |
| Smallest Text Size: 6.0pt | | | |
| Leading: 6.2pt | | | |
| Horizontal Scale: 90% | | | |
| Microtext: N | | | |
| Additional Info (1): N/A | | | |
| Additional Info (2): N/A | | | |
| Additional Info (3): N/A | | | |

AIP_Production_V_INDD - 04_2017 - Harmony - Version 2

200 mm Measuring Bar
If an e-banner DOES NOT appear on the top of this document, THEN this document has NOT been printed from the Harmony system.

IMPORTANT

GSK LOC is responsible to approve the change documentation, artwork brief and final artwork, ensuring that it is accurate, consistent and complete.

GSK SDC is responsible for site technical requirements and pre-press suitability.

GSK Market is responsible to advise SDC when changes required impact the following:

**Formulation
Tablet embossing
Storage conditions
Shelf Life**

ASPEN BAD OLDESLOE

Site Additional Artwork Information Panel

Production Site:
ASPEN_BAD OLDESLOE_GERMANY

Superseded Manufacturing Site Number:
N/A

NOTE TO MARKET

Local approvers must ensure that trade mark and copyright statements included in the brief comply with guidance provided by Legal: Global Trade Marks.

Back Page

إذا أقررت في استخدام ديموفيت
إذا استخدمت الكثير منه أو ابتلغته عن طريق الخطأ، فقد يتسبب ذلك في مرضك. تحدث إلى طبيبك أو اذهب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.
إذا نسيت استخدام ديموفيت
إذا نسيت وضع المحلول على فروة رأسك، فقم باستخدامه بمجرد أن تتذكر. إذا كان الوقت قريباً من الوقت المزمع أن تستخدمه فيه، فانتظر حتى ذلك الوقت.
لا تستخدم جرعة إضافية من ديموفيت لتعويض جرعة فاتتة.
إذا توقفت عن استخدام ديموفيت
إذا كنت تستخدم ديموفيت بانتظام، فتأكد من استشارة طبيبك قبل التوقف عن استخدامه لأن حالتك قد تزداد سوءاً إذا توقفت فجأة.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية المحتملة
مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يُصاب الجميع بأي من هذه الأعراض.
توقف عن استخدام ديموفيت وأخبر طبيبك على الفور في الحالات التالية:

- عندما تجد أن مشكلة فروة رأسك تزداد سوءاً، أو تصاب بطبق جلدي عام أو تورم جلدي أثناء العلاج. قد تكون لديك حساسية تجاه سائل علاج فروة الرأس أو تُصاب بعدي أو بحاجة إلى علاج آخر.
- عندما تُصاب بالصدفية وتظهر لديك بقع معقمة مع القرح تحت الجلد، وهو ما يمكن أن يحدث أثناء أو بعد العلاج، ويُعرف باسم الصدفية البثرية.

قد تلاحظ بعض الآثار الجانبية الأخرى عند استخدام ديموفيت، وتشمل:
آثار شائعة (قد تصيب شخص واحد من كل ١٠ أشخاص)

- شعور بالحرقنة أو الألم أو التهيج أو الحكة في موضع الاستخدام على فروة الرأس.
- آثار غير شائعة (قد تصيب شخص واحد من كل ١٠٠ شخص)
- ترقق الجلد، وهو ما قد يسبب علامات تمدد الجلد
- قد تصبح الأوعية الدموية تحت سطح جلدك ملحوظة ومرئية بشكل أكبر.

نادرًا جدًا (قد تصيب شخص واحد من كل ١٠,٠٠٠ شخص)
استخدام ديموفيت لفترة طويلة من الزمن، أو استخدامه تحت ضمانة محكمة، قد يسبب أي من الأعراض التالية:

- زيادة الوزن
- استدارة الوجه
- البسمة
- ترقق الجلد
- تجاعيد بالجلد
- جفاف الجلد
- تغيير لون الجلد
- زيادة في شعر الجسم
- تساقط الشعر / نقص نمو الشعر / تلف الشعر

وفيما يلي بعض الأعراض الجلدية النادرة الأخرى التي قد تحدث:

- تفاعلات حساسية الجلد في مكان الاستخدام
- تقاعق الحالة
- تهيج/ ألم في مكان الاستخدام
- احمرار
- طفح جلدي أو ارتكاريا
- إذا كنت مصابًا بالصدفية فقد تظهر بقع تحتوي على صديد تحت الجلد.
- قد يحدث هذا نادرًا جدًا أثناء العلاج أو بعده ويعرف باسم "الصدفية البثرية"
- حب الشباب
- التهاب الجلد
- حب الشباب

احذر أيضًا من الأعراض التالية عند الأطفال:

- التأخر في زيادة الوزن
- بطء النمو
- قد تظهر آثار جانبية نادرة جدًا في اختبارات الدم أو عندما يفحصك الطبيب: انخفاض في مستوى هرمون كورتيزول في الدم
- زيادة مستوى السكر في الدم أو البول
- ارتفاع في ضغط الدم
- إغماء عسنة العين (الكاتار/كتار) المياه البيضاء
- زيادة ضغط العين (الجلوكوما) المياه الزرقاء
- مشاكل في الرؤية ناجمة عن انفصال شبكية العين (اعتلال الشبكية والشبكية المصلي المركزي)
- ضعف العظام من خلال فقدان الكالسيوم (هشاشة العظام)
- قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية بعد الفحص الطبي لتأكيد ما إذا كنت تعاني من هذه الحالة

غير معروف (لا يمكن تقدير الوتيرة من البيانات المتاحة)

- تميم الرؤية

الإبلاغ عن الآثار الجانبية
إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فينبغي إبلاغ طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. للإبلاغ عن الأحداث أو الأحداث السلبية المرتبطة باستخدام منتج جلاكوسميثكلاين، يرجى الاتصال بنا عبر: gulf.safety@gsk.com
عندما يُبلغ عن الآثار الجانبية، فإت تساهم في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5. كيفية حفظ ديموفيت

- ابق الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في ملصق الزجاجة أو العبوة الكرتونية بعد كلمة (EXP). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- لا تحفظ الدواء في درجة حرارة تتجاوز ٢٥ درجة مئوية.
- لا تستخدم هذه الزجاجة لأكثر من ٣ أشهر بعد فتحها لأول مرة.
- احفظ العبوة مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام. المحتويات قابلة للاشتعال. احتفظها بعيداً عن جميع مصادر النار واللهب والحرارة. لا تُترك في ضوء الشمس المباشر.
- لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. من شأن هذه التدابير أن تساهم في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات ديموفيت

- المادة الفعالة هي بروبونوات كلوبيتاسول. كل ١ جرام يحتوي على ٠.٥ ملغ من بروبونوات كلوبيتاسول (٠.٠٥٪ وزن/وزن).
- المكونات الأخرى هي الكاربومير، أيزوبروبيل الكحول، هيدروكسيد الصوديوم والماء المقطر.

كيف يبدو ديموفيت ومحتويات العبوة
يوجد داخل كل عبوة زجاجة بلاستيكية مصممة خصيصاً بها فوهة وغطاء، وتحتوي الزجاجة على ٢٥ مل من السائل الزجاج.

التصنيع والتعبئة الأولية:
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Germany
روجعت هذه النشرة الطبية في ٢٢ مارس ٢٠٢١
العلامات التجارية مسجلة أو مرخص بها لمجموعة شركات جلاكوسميث كلاين (GSK).
© ٢٠٢١ مجموعة شركات جلاكوسميث كلاين (GSK) أو مرخصها.

هذا منتج دوائي
المنتج الدوائي هو منتج يؤثر على صحتك ويعد استهلاكه بخلاف التعليمات أمراً خطيراً بالنسبة لك.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء.

- يعد الطبيب والصيدلي خبراء في الأدوية وفوائدها ومخاطرها واستخدامها.
- لا تقاطع فترة العلاج الموصوفة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.
- احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالوج العرب.

7. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

8. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

9. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

10. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

11. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

12. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

13. معلومات إضافية

1. اغسل يديك
2. افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
3. اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
4. يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
5. اغسل يديك مرة أخرى.
6. لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

ديروفيت: محلول موضعي لفروة الرأس

بروبيونات كلوبيتاسول
يرجى قراءة كامل محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج على إعادة قراءتها لاحقاً.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فيرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط، لذا لا تمنحه للغير، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.
- إذا عانيت من أي آثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

- 1 ما هو ديموفيت وما هي دواعي الاستخدام
- 2 ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديموفيت
- 3 كيفية استخدام ديموفيت
- 4 الأعراض الجانبية المحتملة
- 5 كيفية حفظ ديموفيت
- 6 محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ديموفيت وما هي دواعي الاستخدام
يحتوي ديموفيت المحلول الموضعي لفروة الرأس (يطلق عليه اسم "ديروفيت") في هذه النشرة على دواء يسمى بروبونوات كلوبيتاسول، وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمى ستيرويدات، ويساعد في تقليل التورم والتهيج.
يستخدم ديموفيت للمساعدة على تقليل الاحمرار والحكة الناتجة عن بعض مشكلات فروة الرأس، ويشمل ذلك الأمراض الجلدية متكررة الحدوث والصدفية غير المستجيبة لكريمايت الستيرويد الأخرى تركيزاً أو المراهق أو المحلول أو دهانات فروة الرأس.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديموفيت
لا تستخدم ديموفيت في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية (شديد التحسس) تجاه بروبونوات كلوبيتاسول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦)
- إذا كنت تعاني من التهاب في جلد فروة رأسك
- لا تستخدمه على الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة.
- لا تستخدمه إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديموفيت.

التحذيرات والاحتياطات
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الدواء في الحالات التالية:

- قد تعاني من الإدمان في العظام أو قد تتفاقم أي من أعراض الإدمان العظام التي كنت تعاني منها مسبقًا خلال العلاج باستخدام ديموفيت، لاسيما إن كنت تستخدم ديموفيت لفترة طويلة من الوقت أو بشكل متكرر.
- إذا كنت تستخدم أدوية أخرى فموية/ موضعية تحتوي على مركبات الكورتيكوستيروئيد أو الأدوية التي تهدف إلى التحكم في جهازك المناعي (على سبيل المثال لعلاج أمراض المناعة الذاتية أو بعد عمليات زرع الأعضاء)، فقد يؤدي الجمع بين ديموفيت وهذه الأدوية إلى حدوث عدوى خطيرة.
- إذا كان قد سبق ظهور تفاعل حساسية عليك لدى استخدام نوع آخر من الستيروئيد. إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه هذه الضمانات تجعل من السهل على العنصر النشط أن يمر عبر الجلد، مما قد يؤدي بالنهاية إلى استخدام كمية أكثر من اللازم من الدواء بطريق الخطأ. لا تضع ضمانة أو تغطي منطقة فروة الرأس المعالجة بأي طريقة، ما لم يوجهك الطبيب للقيام بذلك.
- إذا وجهك الطبيب لتغطية المنطقة المعالجة بضمادة، فتأكد من تنظيف الجلد قبل فرد ضمانة جديدة، وذلك لمنع الالتهابات.
- إذا كنت تعاني من مرض الصدفية، فسوف يرغب طبيبك في رؤيتك بوتيرة أكثر تكرارًا.
- إذا كنت تضع السائل على جلد متشقق أو تالف أو رقيق.
- إذا كنت تضع السائل على مساحة كبيرة من الجلد.

اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو حدوث أي اضطرابات بصرية أخرى. إذا أصابك أي عدوى أثناء استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. اتبع الحذر البالغ لتجنب دخول السائل في عينيك.

إذا لم تكن متأكدًا إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- تجنب العلاج المستمر لفترة طويلة من الزمن لدى الأطفال فوق سن عام، لأن بشرتهم أرق من بشرة البالغين، ونتيجة لذلك قد تمتص كميات أكبر.
- يجب أن يقتصر الاستخدام على الأطفال لبضعة أيام فقط مع المراجعة الأسبوعية.
- لا ينبغي استخدام الضمانات على الأطفال في المكان الموضوح به سائل فروة الرأس.

ديروفيت والأدوية الأخرى
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دواء آخر، وخاصة إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على ريتونايفير وإينتراكونازول.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة
في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو إن كنت تظنين أنك قد تصبحين حاملًا أو تحططين لإحجاب طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية استخدام ديموفيت
احرص دائمًا على استخدام هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

استخدام هذا الدواء

- عادة ما يوضع ديموفيت على فروة الرأس في الصباح وفي الليل. يمكنك تقليل هذه الوتيرة عندما تبدأ مشكلة فروة رأسك في التحسن أو تتوقف عن الاستخدام عند تمام الشفاء.
- لا تستخدمه على البشرة وفروة الرأس فقط.
- لا تستخدمه بوتيرة أكثر من الموصوفة لك أو أن تستخدمه لفترة طويلة (كاستخدامه كل يوم لعدة أسابيع أو عدة أشهر). إذا كنت بحاجة إلى علاج لفترة طويلة، فقد يقرر طبيبك أنك بحاجة إلى استخدام علاج أقل تكرارًا.
- الجرثيم التي تسبب التهابات تفصل البيئة الدافئة والرطبة تحت الضمانات. إذا تم توجيهك لتغطية المنطقة المعالجة بضمادة، فقم دائمًا بتنظيف الجلد قبل وضع ضمانة جديدة للمساعدة في منع إصابة الجلد بأسفل الضمانة.
- اتبع الحذر الشديد كي لا تضع السائل في عينيك. لا تلمس عينيك حتى تجف يديك جيدًا.
- إذا قمت بشطف الشعر أو غسله بالشامبو، فاحرص على تجفيفه قبل وضع السائل.
- إذا كنت تستخدم سائل فروة الرأس على شخص آخر، فتأكد من غسل يديك بعد الاستخدام أو ارتداء قفازات بلاستيكية من التي تستعمل مرة واحدة فقط.
- هذا المنتج قابل للاشتعال. احتفظ بالسائل بعيداً عن النار واللهب وجميع مصادر الاشتعال، بما في ذلك التدخين، أثناء الاستخدام وبعده مباشرة.

4. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

5. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

6. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

7. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

8. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

ديروفيت: محلول موضعي لفروة الرأس

بروبيونات كلوبيتاسول
يرجى قراءة كامل محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج على إعادة قراءتها لاحقاً.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فيرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط، لذا لا تمنحه للغير، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.
- إذا عانيت من أي آثار جانبية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

- 1 ما هو ديموفيت وما هي دواعي الاستخدام
- 2 ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديموفيت
- 3 كيفية استخدام ديموفيت
- 4 الأعراض الجانبية المحتملة
- 5 كيفية حفظ ديموفيت
- 6 محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو ديموفيت وما هي دواعي الاستخدام
يحتوي ديموفيت المحلول الموضعي لفروة الرأس (يطلق عليه اسم "ديروفيت") في هذه النشرة على دواء يسمى بروبونوات كلوبيتاسول، وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمى ستيرويدات، ويساعد في تقليل التورم والتهيج.
يستخدم ديموفيت للمساعدة على تقليل الاحمرار والحكة الناتجة عن بعض مشكلات فروة الرأس، ويشمل ذلك الأمراض الجلدية متكررة الحدوث والصدفية غير المستجيبة لكريمايت الستيرويد الأخرى تركيزاً أو المراهق أو المحلول أو دهانات فروة الرأس.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديموفيت
لا تستخدم ديموفيت في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية (شديد التحسس) تجاه بروبونوات كلوبيتاسول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦)
- إذا كنت تعاني من التهاب في جلد فروة رأسك
- لا تستخدمه على الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة.
- لا تستخدمه إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديموفيت.

التحذيرات والاحتياطات
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الدواء في الحالات التالية:

- قد تعاني من الإدمان في العظام أو قد تتفاقم أي من أعراض الإدمان العظام التي كنت تعاني منها مسبقًا خلال العلاج باستخدام ديموفيت، لاسيما إن كنت تستخدم ديموفيت لفترة طويلة من الوقت أو بشكل متكرر.
- إذا كنت تستخدم أدوية أخرى فموية/ موضعية تحتوي على مركبات الكورتيكوستيروئيد أو الأدوية التي تهدف إلى التحكم في جهازك المناعي (على سبيل المثال لعلاج أمراض المناعة الذاتية أو بعد عمليات زرع الأعضاء)، فقد يؤدي الجمع بين ديموفيت وهذه الأدوية إلى حدوث عدوى خطيرة.
- إذا كان قد سبق ظهور تفاعل حساسية عليك لدى استخدام نوع آخر من الستيروئيد. إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه هذه الضمانات تجعل من السهل على العنصر النشط أن يمر عبر الجلد، مما قد يؤدي بالنهاية إلى استخدام كمية أكثر من اللازم من الدواء بطريق الخطأ. لا تضع ضمانة أو تغطي منطقة فروة الرأس المعالجة بأي طريقة، ما لم يوجهك الطبيب للقيام بذلك.
- إذا وجهك الطبيب لتغطية المنطقة المعالجة بضمادة، فتأكد من تنظيف الجلد قبل فرد ضمانة جديدة، وذلك لمنع الالتهابات.
- إذا كنت تعاني من مرض الصدفية، فسوف يرغب طبيبك في رؤيتك بوتيرة أكثر تكرارًا.
- إذا كنت تضع السائل على جلد متشقق أو تالف أو رقيق.
- إذا كنت تضع السائل على مساحة كبيرة من الجلد.

اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو حدوث أي اضطرابات بصرية أخرى. إذا أصابك أي عدوى أثناء استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الصيدلي. اتبع الحذر البالغ لتجنب دخول السائل في عينيك.

إذا لم تكن متأكدًا إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- تجنب العلاج المستمر لفترة طويلة من الزمن لدى الأطفال فوق سن عام، لأن بشرتهم أرق من بشرة البالغين، ونتيجة لذلك قد تمتص كميات أكبر.
- يجب أن يقتصر الاستخدام على الأطفال لبضعة أيام فقط مع المراجعة الأسبوعية.
- لا ينبغي استخدام الضمانات على الأطفال في المكان الموضوح به سائل فروة الرأس.

ديروفيت والأدوية الأخرى
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي دواء آخر، وخاصة إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على ريتونايفير وإينتراكونازول.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة
في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو إن كنت تظنين أنك قد تصبحين حاملًا أو تحططين لإحجاب طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية استخدام ديموفيت
احرص دائمًا على استخدام هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

استخدام هذا الدواء

- عادة ما يوضع ديموفيت على فروة الرأس في الصباح وفي الليل. يمكنك تقليل هذه الوتيرة عندما تبدأ مشكلة فروة رأسك في التحسن أو تتوقف عن الاستخدام عند تمام الشفاء.
- لا تستخدمه على البشرة وفروة الرأس فقط.
- لا تستخدمه بوتيرة أكثر من الموصوفة لك أو أن تستخدمه لفترة طويلة (كاستخدامه كل يوم لعدة أسابيع أو عدة أشهر). إذا كنت بحاجة إلى علاج لفترة طويلة، فقد يقرر طبيبك أنك بحاجة إلى استخدام علاج أقل تكرارًا.
- الجرثيم التي تسبب التهابات تفصل البيئة الدافئة والرطبة تحت الضمانات. إذا تم توجيهك لتغطية المنطقة المعالجة بضمادة، فقم دائمًا بتنظيف الجلد قبل وضع ضمانة جديدة للمساعدة في منع إصابة الجلد بأسفل الضمانة.
- اتبع الحذر الشديد كي لا تضع السائل في عينيك. لا تلمس عينيك حتى تجف يديك جيدًا.
- إذا قمت بشطف الشعر أو غسله بالشامبو، فاحرص على تجفيفه قبل وضع السائل.
- إذا كنت تستخدم سائل فروة الرأس على شخص آخر، فتأكد من غسل يديك بعد الاستخدام أو ارتداء قفازات بلاستيكية من التي تستعمل مرة واحدة فقط.
- هذا المنتج قابل للاشتعال. احتفظ بالسائل بعيداً عن النار واللهب وجميع مصادر الاشتعال، بما في ذلك التدخين، أثناء الاستخدام وبعده مباشرة.

4. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

5. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

6. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

7. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

الاستخدام على الأطفال

- لا تستخدم هذا الدواء على طفل عمره أقل من سنة.
- من المهم بشكل خاص الحرص على عدم تجاوز الكمية الموصوفة عند الاستخدام على الأطفال.
- لا ينبغي أن تستمر دورة العلاج للطفل عادة أكثر من بضعة أيام، ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. قد يرغب الطبيب في رؤية الطفل كل أسبوع أثناء استخدام دهان ديموفيت لفروة الرأس.

8. لا تستخدم محبف الشعر الكهربائي لتجفيف شعرك

إرشادات حول كيفية استخدام السائل

- 1 اغسل يديك
- 2 افتح غطاء الزجاجة وضع الفوهة مباشرة على الجزء المزمع علاجه من فروة الرأس.
- 3 اضغط الزجاجة برفق لتغطية المنطقة بطبقة رقيقة ومتساوية من السائل.
- 4 يمكنك فرك هذا السائل، لكنك لست مضطراً إلى ذلك. سوف تشعر ببعض البرودة في فروة رأسك حتى يجف السائل.
- 5 اغسل يديك مرة أخرى.
- 6 لا تستخدم أكثر من الكمية الموصوفة لك

| | |
|----------------------------|--|
| Version: 1 | |
| gsk | |
| Harmony AMS Artwork | |