

Augmentin 1 gm film-coated Tablets

Amoxicillin trihydrate and Potassium clavulanate

Information for the patients

Read this patient information leaflet carefully before taking or using this medicine. This medicine has been prescribed for you personally and you are not allowed to give it on to other persons. Even if these persons suffer from same symptoms as you, the medicine could be harmful for them. Keep the patient information leaflet, as you may need to read it again later.

What Augmentin is and what it is used for?

Augmentin is an antibiotic from the group of penicillins. It consists of two active ingredients: Clavulanic acid and

Clavulanic acid dominates the main immunity or resistance mechanism of numerous resistant bacteria against penicillins and in this way it protects Amoxicillin, which can thus destroy the bacteria. This effectiveness makes Augmentin effective against numerous bacterial infections.

Augmentin should only be used with a prescription from your doctor only for treatment of the following bacterial

- nose, throat, tonsil, front / maxillary sinus and ear infections;
- respiratory tract infections (bronchi and lungs);
- kidney, bladder and urinary tract infections:
- infections of the genital organs (gonorrhea, mucous discharge); gynecological infections;
- Skin and soft tissue infections (boils, abscesses, etc.).

What precautions should be taken into consideration?

Your doctor has prescribed this medicine in order to treat your current illness

The antibiotic which exist in Augmentin is not effective against all microorganisms that cause infectious diseases. Using an incorrectly chosen or incorrectly dosed antibiotic can cause other complications. Therefore, never use it by yourself for the treatment of other diseases or other people. Even if the infections happen later once again, you are not allowed to use Augmentin without a new medical consultation.

The symptoms of the disease often disappear before the infection has completely healed. Therefore, the treatment should not be stopped early, even if you feel better. Depending on the circumstances and according to the doctor's prescription, the treatment may last for two weeks or may even be longer.

When should not you use Augmentin?

You should not use Augmentin if you have previously had an allergic reaction to Augmentin, penicillins or cephalosporins. An allergy or hypersensitivity manifests itself, for example, in symptoms such as red spots on skin, fever, asthma, shortness of breath, circulatory problems, swelling of the skin (e.g. nettle fever) and mucous membranes, skin rashes or a painful tongue.

Augmentin should not be used if you are known or suspected to be hypersensitive to any of the other ingredients

You must not take Augmentin if you have Pfeiffer's glandular fever or lymphoblastic leukemia.

When should you take caution while using Augmentin?

This medicine may affect your ability to react, drive and use tools or machines.

If you are taking an oral contraceptive (pill), there is a possibility that its effectiveness may be reduced during the therapy with the antibiotic. This note also applies to Augmentin. Therefore, your doctor or pharmacist can recommend further contraceptive measures.

ndigestion is possible when taking Augmentin. In the event of severe gastrointestinal disorders with vomiting and diarrhea, the medication should be discontinued and the doctor should be informed immediately. He or she should also be notified if a rash or itching occurs.

If diarrhea occurs, no drugs that inhibit bowel peristalsis (bowel movement) should be taken

Individual cases of particularly serious allergic reactions, such as the (possibly life-threatening) drug eruption with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) have been described after taking Augmentin. Signs of such skin reactions are:

- Flu-like symptoms with rash and fever,
- Skin rash, swelling of the face or other parts of the body.

If you experience such symptoms after taking Augmentin, you must stop the treatment and contact a doctor immediately! If you suffer from allergies, allergic asthma, hay fever or nettle fever, special care should be taken when taking Augmentin because of possible hypersensitivity.

Patients who have to take allopurinol-containing preparations (like Zyloric) at the same time are more prone to

Inform your doctor if you have kidney illness; he or she will then prescribe a dosage tailored to your needs, which may differ from the table below in the "Usual Dosage" section. Inform your doctor if you are taking anticoagulant agent (anticoagulants). Inform your doctor if you are taking any preparations containing mycophenolate mofetil that are used after organ transplantation to prevent acute graft

If you are taking preparations containing digoxin, you must inform your doctor or pharmacist.

If kidney or liver function is insufficient, special caution is advised. Inform your doctor or pharmacist if you: suffer from other diseases

- Have allergies or
- take other medicines (including those you have bought yourself!) or use other medicines externally

Can Augmentin be used during pregnancy or while breastfeeding?

The decision of taking any kind of medication during pregnancy should be taken with extreme caution and only after consulting your doctor or pharmacist. Studies about pregnant women with premature rupture of the foetal membrane (pPROM), have reported that preventive treatment with Augmentin may cause an increased risk of sometimes serious tissue-damaging intestinal inflammation in the newborn.

Since Augmentin is excreted in breast milk in small amounts, the possibility of a hypersensitivity reaction (with symptoms such as reddening of the skin and fever) or diarrhea is to be expected in infants. Therefore, Augmentin should not be taken while breastfeeding. Be sure to inform your doctor or pharmacist if you are pregnant, planning to become pregnant, or if you are breastfeeding. They are the only ones who can decide whether you can take Augmentin during these times.

How do you use Augmentin?

Usual dosage

Augmentin should preferably be taken with at least half a glass of water at the start of meals. This ensures an optimal effect and tolerance. Unless otherwise prescribed by the doctor, the following dosage applies: For adults

Mild, moderate to severe infections: - 2x daily Augmentin 1 gm (875/125) The break groove of the 1 gm film-coated tablet is only intended to simplify tablet taking. The tablets are not intended to halve the dosage. Both halves must be taken at the same time.

Antibiotic therapy that has been started should be carried out for as long as prescribed by the doctor. The symptoms of disease often disappear before the infection has completely healed. For this reason, do not stop therapy early, even if you feel much better

Do not change the prescribed dosage on your own. If you think the medicine is too weak or too strong, consult vour doctor or pharmacist.

Which side effects may occur while using Augmentin?

Gastrointestinal disorders such as stomach upset or nausea. Reactions such as nausea, loss of appetite, flatulence, vomiting, diarrhea, loose stools, dyspepsia, abdominal pain and inflammation of the tongue or oral mucosa may also occur.

If Augmentin is taken at the start of meals, gastrointestinal complaints are less common. Allergic reactions are common with Augmentin, as with all drugs in the penicillin group.

Rashes, reddening of the skin, itching and urticaria (hives) may occur. Fungal infections of the skin / mucous membranes may also occur.

Dizziness and headache may occasionally occur.

Very rarely, hyperactivity, inflammation of the meninges (aseptic meningitis), agitation, anxiety, insomnia, confusion, changes in behavior, drowsiness, convulsions and sensory disorders may occur. Teeth surface staining were rarely observed. This usually disappears when you brush your teeth.

Dark tongue, hyperkinesis (excessive movement), changes in blood count, prolongation of bleeding time and prothrombin time, inflammation of the liver (hepatitis), inflammation of the kidneys and dysfunction of the kidney have been observed very rarely.

Very rarely flu-like symptoms with rash, fever, swollen glands and abnormal blood tests (including white blood cells (eosinophilia) and liver enzymes) (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)) have been observed (see "When to take caution when using Augmentin").

When administering amoxicillin at the age of 0-9 months, damage to the enamel (e.g. white streaking, discoloration) of the definitive incisors cannot be excluded. Jaundice has been rarely reported.

Consult your doctor immediately if you experience: • nettle fever, extensive rash, reddening of the skin;

- vellowish color of the skin or white part of the eyes; sudden onset of abdominal pain or vomiting;
- severe, bloody or persistent diarrhea;
- Breathing problems in the form of asthma attacks and hay fever.

If you get any side effects, inform your doctor or pharmacist immediately. This applies in particular to side effects that are not specified in this patient information leaflet.

To report Product Complaint/s or Adverse Event/s associated with the use of GSK product/s, please contact us via: gulf.safety@gsk.com.

What should also be noted?

The medicinal product should only be used until the date marked "EXP" on the package.

Storage instructions

Store in a dry place at or below 30°C. Keep out of reach of children.

Store in the original package in order to protect from moisture. Tablets in desiccated pouch packs should be used within 14 days of opening.

If you notice discoloration of the Augmentin film-coated tablets, it could be a change in the preparation. If this happens, contact your doctor or pharmacist immediately

After the end of treatment, the medicinal product and the remaining contents of your delivery point (doctor or pharmacist) should be disposed of properly. Your doctor or pharmacist will give you further information. These people have the detailed information.

What does Augmentin contain?

Active ingredients

Augmentin contains the active substances amoxicillin (as amoxicillin trihydrate) and clavulanic acid (as potassium salt). Below is the detailed composition of the various commercially available film-coated tablets:

1 film-coated tablet contains:	Amoxicillin	Clavulanic acid	Amoxicillin / clavulanic acid ratio
Augmentin 1 gm (875/125) film-coated tablets	875 mg	125 mg	7:1

List of Excipients

Colloidal silicon dioxide, sodium starch glycollate, magnesium stearate (E572), microcrystalline cellulose, titanium dioxide (E171), hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, dimethicone (silicon oil).

Augmentin is supplied in a carton containing 14 tablets in blisters inside a desiccated pouch.

Packed by Pharmaline - Lebanon

Licensed by GlaxoSmithKline Export Ltd., UK

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies. © 2020 GSK group of companies or its licensor.

This patient information leaflet was last reviewed in February 2020.

Advice/medical education

Antibiotics are used to treat infections caused by bacteria. They have no effect against infections caused by

Sometimes an infection caused by bacteria does not respond to a course of an antibiotic. One of the commonest reasons for this to occur is because the bacteria causing the infection are resistant to the antibiotic that is being

Bacteria can become resistant to antibiotics for many reasons. Using antibiotics carefully can help to reduce the

When your doctor prescribes a course of an antibiotic it is intended to treat only your current illness. Paying attention to the following advice will help prevent the emergence of resistant bacteria that could stop the

- 1. It is very important that you take the antibiotic at the right dose, at the right times and for the right number of days. Read the instructions on the label and if you do not understand anything ask your doctor or pharmacist
- 2. You should not take an antibiotic unless it has been prescribed specifically for you and you should use it only
- to treat the infection for which it was prescribed. 3. You should not take antibiotics that have been prescribed for other people even if they had an infection that
- was similar to yours.
- 4. You should not give antibiotics that were prescribed for you to other people.

taken. This means that they can survive and even multiply despite the antibiotic.

5. If you have any antibiotic left over when you have taken the course as directed by your doctor you should take the remainder to a pharmacy for appropriate disposal.

This is a Medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. Keep all medicaments out of the reach of children.

Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists.

ماذاالذي يحتوي عليه عقار أوجمنتين؟

يحتوي عقار أوجمنتين على المواد الفعالة أموكسيسيلين (مثل الأموكسيسيلينترايهيدرات) وحمض الكلافولينيك (مثل ملح البوتاسيوم). فيما يلى ستجد التكوين التفصيلي للأقراص المختلفة المغطاة بالفيلم المتداولة في الأسواق:

		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
نسبة حمض أموكسيسيلين / حمض الكلافولانيك	حمض الكلافولينيك	أموكسيسيلين	ا قرص مغلف بالفيلم يحتوي على:
1 . V	١٢٥ ملغ	۸۷۵ ملغ	عقار أوجمنتين ١ جرام (١٢٥/٨٧٥) أقراص مغلفة بالفيلم

قائمة المواد الإضافية ثاني أكسيد السليكون الغرواني وجليكوليت نشاء الصوديوم وسترات الماغنيسيوم " 5772" والسليلوز البللوري المكروى وثانى أكسيد التيتانيوم "E171" وبروبايل هيدروكسي ميثيل سليلوز وبولي إيثيلين الجليكول ودايميثيكون (زيت السليكون).

توضيب شركة فارمالين ش.م.ل -لبنان بإجازة من شركة GlaxoSmithKline Export Ltd., UK

منع ظهور البكتيريا المقاومة التي قد تمنع عمل المضادات الحيوية.

تمت مراجعة هذه النشرة آخرمرة في فبراير ٢٠٢٠.

العلامات التجارية مملوكة أو مرخص بها لمجموعة شِركات جلاكسوسميث كلاين (GSK). © ۲۰۲۰ مجموعة شركات جلاكسوسميث كلاين (GSK) أو مرخصها.

يتوفر أوجمنتين في علبة كرتونية تحتوي على ١٤ قرصًا في شرائط حبيبية داخل غلاف مجفف.

ملاحظة / توضيح طبي تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية. وتعد هذه المضادات غير فعالة ضد الالتهابات الفيروسية.

في بعض الأحيان لا تستجيب العدوي البكتيرية للعلاج بالمضادات الحيوية. ويعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لذلك هو أن البكتيريا المسببة للعَّدوى تقاوم المضادات الحيوية المستخدمة. ويعنى هذا أن البكتريا يمكن أن تبقى حية وأيضا تتكاثر رغم تناول المضادات الحيوية.

مكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لعدة أسباب. ويمكن للاستخدام الحذر للمضادات الحيوية أن يساعد في تقليل فطر أن تصبح البكتيريا مقاومة لها. عندما بصف لك طبيبك العلاج باستخدام المضادات الحيوية. فإن هذا فقط لغرض علاج حالتك الحالية. وتساعد النصائح التالية على

ا– من المهم جدًّا أن تتناول المضاد الحيوي بالجرعةِ المناسبة وفي الأوقات المناسبة وللمدة المناسبة. اقرأ التعليمات على الملصق واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كنت لا تفهم شيئًا ما من ذلك. يجب أن لا تتناول المضاداتُ الحيوية إذا لم تكن موصوفة لك تحديدا ويجب عليك استخدامها فقط لعلاج العدوى الموصوفة من

٣- يجبُّ ألا تأخذ أي مضادات حيوية موصوفة لأشخاص آخرين حِتى لو كانوا مصابين بعدوي مماثلة للتي عندك ٤– لا يُنبغي عليك أعطاء المضادات الحيوية التي وصفّت لكُ لأشخاص آخرين. ٥– إذا تبقى أيًا من المضادات الحيوية بعد أنتهاء العلاج وفقًا لتوجيهات الطبيب. فيجب أن تأخذ المضادات الحيوية غير المستخدمة إلى ئى. صيدلية للتخلص منها بشكل صحيح.

ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند تِناول عقار أوجمِنتين؟

ذا تم تناول عقار أوجمنتين في بداية الوجبات، فإن شكاوي الجهاز الهضمي تكون أقلِ شيوعًا. اُلتفاعلات التحسسية شائعةً عند تناول عقار أوجمنتين، كما هو الحال معَّ جميعَ الأُدوية في مجموعة البنسلينات

في بعض الحالات النادرة للغاية، من الممكن أن يحدث فرط النشاط والتهاب السحايا (التهاب السحايا العقيم) والإثارة والقلق والأرق والارتباك والتغيرات في السلوك والدوار والتشنجات والاضطرابات الحسية.

من النادر للغاية رصد أعراض مثل اللسان الداكن. وفرط الحركة (النشاط الحركى المفرط). وتغيرات في صورة الدم. وزيادة وقت النزيف. ووقت لبروثرومبين، والتهاب الكبد (التهاب الكبد المرضي). والتهاب الكلى وقصور وظأَّئف الكلى. نادرًا ما تم رصد أعراض شبيهة بالآنفلونزا يُصاحبها الطفح الجلدي والدميّ وتورم الغدد وقيم الدم غير الطبيعية (بما في ذلك خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات) وإنزيمات الكبد) (طفح دوائي مع فرط الحمضات وأعراض جهازية (DRESS)) (أنظر"متى يجب عليك توخي الحذر

عند تناول الأموكسيسيلين في عمر ٩-٩ أشهر. لا يمكن استبعاد تلف مينا الأسنان (مثل الخطوط البيضاء، وتغير اللون) للقواطع. نادرا ما يتم رصد حدوث اليرقان."

> استشرطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية: • مشاكل في التنفس على شكل نوبات ربو وحمى القش.

ذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، عليك التحدث مع طبيبك أو الصيدلي على الفور. ينطبق هذا بشكل خاص على الأعراض الجانبية غير

ما الذي يجب مراعاته إلى جانب ذلك؟

يجب استخدام العقار الطبي فقط حتى حلول التاريخ الذي يحمل علامة "EXP" على العبوة.

حفظ تعيدًا عن متناول الأطفال. بُخزن في العبوة الأصلية لحمايته من الرطوبة. يجب استخدام الأقراص المتوفرة في عبوات أغلفة مجففة خلال ١٤ يومًا من فتحها.

ية. إذا لاحظت تغير لون أقراص أوجمنتين المغلفة بالفيلم، فقد يكون ذلك علامة على تغير المستحضر الطبي. إذا حدث ذلك، اتصل بطبيبك و الصيدلي على الفوريعد انتهاء العلاج. يجب التخلص من المنتج الطبي والمحتويات المتبقية بشكل صحيح بتسليمها إلى نقطة لتسليم (الطبيب أو الصيدلي). سيعطيك طبيبك أو الصيدلي المزيد من المعلومات حول ذلك. حيث أن هؤلاء الأشخاص لديهم معلومات

· في بعض الحالات الفردية بعد تناول عقار أوجمنتين، تم رصد بعض ردود الفعل التحسسية الجسيمة، مثل الطفح الدوائي (والذي قد يكون خطرًا على الحياة) مع فرط الحمضات وأعراض جهازية ("DRESS"). العلامات التي تُشير إلى هذه التفاعلات الجلدية هي: • أعراض شبيهة بمرض الإنفلونزا يُصاحبها طفح جلدي وحمى،

 انتفاخ الوجه أو أجزاء أخرى من الجسم. إذا واجهت مثل هذه الأعراض بعد تناول عقار أوجمنتين. يجب عليك التوقف عن تناول العقار على الفور والاتصال بالطبيب! إذا كنت تعانى من الحساسية أو الربو التحسسي أو حمى القش أو القراص، فيجب عليك توخّي الحذر البالغ عند تناول عقار أوجمنتين بسبب فرط

المرضى الذين يضطرون إلى تناول مستحضرات طبية تحتوي على مادة الألوبورينول (مثل زيلوريك) في نفس الوقت يكونون أكثر عرضة أخطرٌ طّبيبك إذاً كنت تعّاني من مشاكل في الكلي: سيصف لك الطبيب عندئذ جرعة مخصصة لاحتياجاتك. والتي قد تختلف عن الجدول إلوارد فيما يلي في فصل "الجرعة المعتادة"." - ورد عينه يتي صلى البرك المسادة. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول مميعات الدم (مضادات التخثر). أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي مستحضرات طبية تحتوي على ميكوفينولات موفيتيل، والتي يتم استخدامها بعد زرع الأعضاء لمنع ردود الفعل الرافضة للعضو الاصطناعي المزروع.

ينصح بحذرٍ خاص إذا كنت تعاني من قصور في وظائف الكلى أو في وظائف الكبد. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت:

إذا كنت تتناول مستحضرات تحتوي على الديجوكسين، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بذَّلك.

يتسبب في بعض الحالات في زيادة خطر الإصابة بالتهاب معوي بالغ يتسبب في تلف الأنسجة لدى الجنين.

حيث أن هؤلاء هم الوحيدون الَّذين يمكنهم أن يقرروا ما إذاً كان يمَكنك تناول عقار أوجّمنتين خَلالً هذه الأوقات.

• تتناول أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية التي تشتريها بنفسك) أو تستخدمها خارجيًا هل يمكن تناول عقار أوجمنتين أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة؟

<u>عنوه الحنين</u> يجب اتخاذ القرار بشأن تناول أي نوع من الأدوية أثناء الحمل بحرص شديد ولا يُسمح بأن يتم ذلك إلا بعد استشارة طبيبك أو الصيدلي حول ذلك. أفادت الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل المصاباتُ بتمزقً الأغشية المبكر أن العلاج الوفائي باستخدام عقار أوجمنتين قد

بما أن عقار أوجم نتين يفرز في حِليب الثدي بكميات صغيرة. فإن احتمال حدوث رد فعل يتسم بفرط الحساسية (مع أعراض مثل احمرار الجلد والحمّى) أو الإسهال فو أمر متوقع عند الأطفال الرُضع. لذلك لا ينبغي تناول عقار أوجمنتين أثناء الرضاعة الطبيعية حتى لا يصل إلى الرضيع عبر الرضاعة. تأكد من إخطار طبيبك أو الصيدلي إذا كنتِ حاملاً، أو تخططين للحمل، أو إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

فضل تناول عقار أوجمنتين مع تناول نصف كوب من الماء على الأقل في بداية الوجبة. فذلك يضمن التأثير الأمثل وقدرة التحمل المثالية. ما لم يصف طبيبك خلاف ذلك، تنطبق الجرعة التالية:

> العدوى الخفيفة والمتوسطة حتى الالتهابات الشديدة: - مرتان من عقار أوجمنتين يوميًا ١ جرام (١٢٥/٨٧٥)

إلى النَّصفُ. يجب أخذ كلا النصفين في نفس الوقَّت. ً و . عند بدء العلاج بالمضادات الحيوية، يجب إتمام العلاج طوال المدة التي يحددها الطبيب دون توقف.

لا تغير الجرعة التي يصفها لك الطبيب من تلقاء نفسك. إذا كنت تعتقد أن الدواء ضعيف جدًا أو قوي جدًا. فعليك التشاور مع طبيبك أو



قراص أوجمنتين اغم المغلفة عِللِّينُ ترايهيدرَّات وبوتاسيوم كلافيولانيت

برجاء قراءة نشرة العبوة هذه بعناية قبل تناول الدواء أو قبل استخدامه. تم وصف هذا الدواء لك بصورة شخصية. وغير مسموح لك بأن تمنحه إلى الأخرين. حتى لوظهرت لديهم نفس إلأعراض التي تعاني منها. فقد يُعرضهم تناول هذا الدواء للضرر. حتفظ بنشرة الدواء، فقد ترغب في قراءتها مرة أخرى لاحقًا

عقار أوجمنتين هو مضاد حيوي من مجموعة البنسلينات. ويتكون هذا المضاد الحيويّ من مكونين نشطين: حمض الكلافولينيك وبحو سيسيين. يتحكم حمض الكلافولينيك في نظام المناعة الرئيسي أو القدرة الرئيسية على مقاومة العديد من البكتيريا التي تقاوم البنسلين. وبهذه الطريقة بحمي الأموكسيسيلين الذي يمكنه تدمير البكتيريا. وطريقة التأثير هذه تجعل من عقار أوجمنتين عقاراً فعالًا في علاج العديد

لا يُسِمح باستخدام عقار أوجمنتين إلا بموجب الحصول على وصفة طبية مِن طبيبك فقط لعلاج العدوى البكتيرية التالية: • الأنف، والحنجرة، واللوزتين، والجيبُ الأنفي الأمامي أو جيب الفك العلوي الأدن. • عدوى الجهاز التنفسي (القصبات الهوائية والرئتين)؛

· عدوى الأعضاء التناسلية (السيلان وإفراز المخاط)؛

قام طَّبيبك بوصفُّ هذا العقار الطبي لعلاج المرض الذي تعاني منه حاليًا.

وجديرٌ بالذكر أن المضادات الحيوية في عقار أوجمنتين ليست فعالة تجاه جميع الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الأمراض المعدية. قد يؤدى استخدام أي مضاد حيوي يتم اختياره بشكل غير صحيح أو تناول جرعات غير مناسبة منه إلى حدوث مضاعفات أخرى لذلك، لا تُستّخدم المضاد الحيوي أبدًا من تلفاء نفسك لعلاج أمراض أخرى أو لِعِلاج أشخاص آخرين. حتى عند ظهور نفس العدوى مجددًا في وقت لاحق، لا يُسمح بِاستخدام عقار أوجمِنتين بدون استشارة اِلطبيب مرةً أخرى.

غالبًا ما تختفي أعراضٍ المرض قبل أن تشفي العدوى تمامًا، ومن ثمّ لا يُسمح بإيقاف العلاج قبل الأوان حتى لو كنت تشعر بتحسن في

الحساسية أو فرط الحساسية في أعراض تكمن على سبيل المثالُّ في ظهور البقع الحمراء على البشرة والحمى والربو وضيق التنفس وظهور مشاكل في الدورة الدموية وتورم الجلد (مثل حمى القراص) والأغشية المخاطية والطفح الجلدي أو وجود ألم في اللسان لا يُسمح باستخدام عقار اوجمنتين إذا كنت تعرف او تشتبه إصابتك بفرط الحساسية تجاه اي من المكونات الأخرى المستخدمة في

يجب عليك عدم تناول عقار أوجمنتين إذا كان لديك حمى غدية أو إذا كنت مُصاب بسرطان الدم الليمفاوى.

قد يؤثر هذا العقار الطبيّ على قدرتك على الاستجابة والقيادة وقدرتك على استخدام الأدوات أو الماكينات

من الممكن التعرض لعسر الهضم أثناء تناول عقار أوجمنتين. في حالة الإصابة باضطرابات حادة في الجهاز الهضمي يُصاحبها أعراض مثل القيء والإسهال يجب التوقف عن تناول العقار الطبي وإبلاغ الطبيب على الفور كما يجب إبلاغًه في حالة حدوث طفح جلدي أو حكة



تحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. فالطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره. · لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك. لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية. لا تترك الأدوية في متناول أيدى الأطفال.

> بجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

ن هذا دواء

LOCAL 180 x 650 mm PANTONE VIOLET 527 PANTONE ORANGE 1505 BLACK

DESTINATION **DIMENSIONS**

COLORS

اضطرّابات الْجهاز الْهَضميّ مثل اصطّراب المعدة أو الغّنيان. يمكّن أن تحدّث ردود فعل مثل الغنيان أو فقدان الشهية أو انتفاخ البطن أو القيء أو الإسهال أو لين البراز أو سوء الهضم أو آلام البطن أو التهاب اللسان أو الغشاء المخاطي للفم.

بمكن أن يحدث الطفح الجلدي واحمرار الجلد والحكة والشرى (الشرية). يمكن أن تحدث الالتهابات الفطرية للجلد / الأغشية المخاطية. قد يظهر دوار وصداع في بعض الحالات.

نادرًا ما يحدث تلون الأسنان السطحيّ. وتختفي هذه الأعراض عادةً عند تنظيف أسنانك.

عند استخدام عقار أوجمنتين").

• حمى القراص، الطّفح الجُلدي ، احمرار في الّجلد. اصفرار الجلد أو اصفرار الجزء الإبيض من العين · ظهور مفاجئ ٍ لاَ لام في البطن أو القيء.

من احل تسحيل شكوي بخصوص الدواء او اعراض حانبية مرتبطه باستخدام دواء شركه GSK

الرجاء التواصل عبر gulf.safety@gsk.com

يُخزن في مكان جاف عند أو أقل من ٣٠ ° مئوية.

الغرض من خط كسٍر القرص المغلف بالفيلم في العقار بتركيز اجرام فقط هو تبسيط تناول القرص.فلا يقصد به أن يتم خفض الجرعة وغالبًا ما تختفّي أعراض المرض قبل أن تشُفى العدوى تمامًا. ومن ثمّ، يجب ألا تتوقف عن تناول العلاج قبل الأوان، حتى إذا كنت تشعر







• عدوى الكِلَى والمثانة والمسالك البولية.

• عدوى ذات الصلة بأمراض النساء. • عدوى الجلدية وعدوى الأنسجة الرخوة (البثور، الخراجات، إلخ). ما هي الأمور التي يجب الانتباه لها؟

حالتك الصحية. اعتمادًا على الظروف و وفقًا لما يصفه الطبيب، قد يستغرق العلاج مدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر. متى يجب ألا أتناول عقار أوجمنتين؟ يجبُّ أَلَّا تَنَاوِل عَفَاراً وَجِمَنتَيْنَ إِذَا كَإِنَّ لَديك سابقًا رد فعل تحسسي تجاه عقاراً وجمنتين أو البنسلين أو السيفالوسبورين. تظهر

متى يجب عليك توخى الحذر عند تناول عقار أوجمنتين؟

إذا كنت تتناولين أدوية لمنع الحمل عن طريق الفم (حبوب منع الحمل). فمن المحتمل أن تنخفض فعالية هذه الأدوية أثناء العلاج باستخُدام المضادات الحيوية. تنطبق هذه الملاحظة أيضًا علَى عقار أوجمنتين. لذلك يمكن أن يوصي طبيبك أو الصيدلي بفرض المزيد من التدابير لمنع الحمل في هذه الفترة.

في حالة الإصابة بالإسهال، لا ينبغي تناول أي أدوية تُثبط التحركة الدودية للأمعاء (حركة الأمعاء).