



نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

أفودارت كبسولات لينة بتركيز ٠,٥ ملجم دوتاستيرياد

يُرجى قراءة هذه النشرة الطبية كاملة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
اضغط بهذه النشيط الطبية فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
إذا كانت لديك أية استفسارات أخرى يجب سؤال طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني.
و وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فلا يجوز إعطائه للأخرين.
فقد يؤذنهيم حتى لو كانت لديهم نفس العلامات المرضية الموجودة لديك
يجب استشارة طبيبك أو الممرضة أو الصيدلاني إذا تعرّضت لأي من الآثار الجانبية، ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

- معلومات عن أفودارت ودواعي استعماله
- معلومات يجب معرفتها قبل تناول أفودارت
- كيفية تناول أفودارت
- الآثار الجانبية المحتملة
- كيفية تخزين أفودارت
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١- معلومات عن أفودارت ودواعي استعماله

يستخدم أفودارت لعلاج الرجال العصابين بتضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد) – وهو نمو غير سرطاني لغدة البروستاتا بسبب فرط إفراز هرمون يسمى ثنائي هيدروتستوستيرون.

المكّن القهار هو دوتاستيرياد. وهو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات مختزلة الألفا.

ومع نمو البروستاتا، يمكن أن تنتج مشكلات بولية، مثل صعوبة التبول وتكرار الحاجة إلى الذهاب إلى المراحيض. كما يمكن أن يسبب ذلك زيادة بطء وضعف تدفق البول. إذا لم يتم العلاج، يتعرض المريض لخطر احتباس البول تمامًا (احتباس البول الحاد)، ويتطلب هذا علاجًا طبيًا فوريًا. وفي بعض الحالات، تكون الجراحة ضرورية لاستئصال غدة البروستاتا أو تقليص حجمها. يعمل أفودارت على تقليل إفراز هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، مما يساعد في تقليص حجم البروستاتا وتخفيف الأعراض. وهذا سيقفل من خطر حدوث احتباس البول الحاد والتهاب المثانة.
يمكن أيضًا استخدام أفودارت مع دواء آخر يسمى تامسولوسين (يستخدم لعلاج أعراض تضخم البروستاتا).

٢- معلومات يجب معرفتها قبل تناول أفودارت

- في حالة وجود حساسية لدوتاستيرياد أو غيره من مثبطات مختزلة الألفا ه أو الصويا أو الفول السوداني أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (واردة في القسم ١)
- إذا كنت تعاني من مرض كبدى حاد.

← إذا كنت تتعقد أن أيًا من هذه الحالات تنطبق عليك، فلا تتناول هذا الدواء حتى تراجع طبيبك.

هذا الدواء للرجال فقط. يُمنَع تناوله مِن قِبَل النساء أو الأطفال أو المراهقين.

تحذيرات واحتياطات

يجب استشارة طبيبك قبل تناول أفودارت.

تأكد من معرفة طبيبك بأي مشكلات في الكبد. إذا سبقت لك الإصابة بأي مرض يؤثر على الكبد، فقد تحتاج إلى بعض الفحوصات الإضافية أثناء تناول أفودارت.

يجب على النساء والأطفال والمراهقين تجنب ملامسة كبسولات أفودارت التي يحدث بها تسريب. لأنه من الممكن امتصاص المكوّن الفَعّال من خلال الجلد. وإذا حدثت أي ملامسة للجلد، فاغسل المنطقة المتأثرة على الفور بالماء والصابون.

يجب استخدام واقيات ذكورية خلال الاتصالات الجنسية. تم العثور على دوتاستيرياد في السائل المنوي لدى الرجال الذين يتناولون أفودارت. إذا كانت زوجتك حاملًا أو يمكن أن تحمل، يجب أن تجنبها التعرض لسائلك المنوي لأن دوتاستيرياد قد يؤثر على النمو الطبيعي للأطفال الذكور. ثبت أن دوتاستيرياد يقلل عدد الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية. ويمكن أن يخفض هذا من مستوى خصوبتك.

يؤثر أفودارت على تحاليل مستوى المستضد البروستاتي النوعي (PSA) في الدم، والتي تُستخدم عادةً للكشف عن سرطان البروستاتا. من المفترض أن يكون طبيبك على دراية بهذا التأثير، ويمكنه استخدام التحاليل للكشف عن سرطان البروستاتا. إذا كنت تجري تحليلًا لمستوى المستضد البروستاتي النوعي في الدم، فأخبر طبيبك بأنك تتناول أفودارت. **يجب أن يجري الرجال الذين يتناولون أفودارت تحاليل منتظمة لمستوى المستضد البروستاتي النوعي.**

• في دراسة سريرية لرجال معرضين لزيادة خطورة الإصابة بسرطان البروستاتا، لوحظت إصابة الرجال الذين تناولوا أفودارت **بشكل خطير من سرطان البروستاتا على نحو أكثر من** الرجال الذين لم يتناولوا أفودارت، ولا يُعرّف بوضوح تأثير أفودارت على هذا الشكل الخطير من سرطان البروستاتا.
• **يمكن أن يسبب أفودارت تضخمًا وثمًا في الثديين.** إذا أصبح هذا الألم مزعجًا أو إذا لاحظت **كتلًا في الثدي أو إفرازات من الحلمة** يجب أن نتحدث إلى طبيبك حول هذه التغييرات لأنها قد تكون علامات لحالة خطيرة، مثل سرطان الثدي.

← **اتصل بطبيبك أو الصيدلي** إذا كانت لديك أي أسئلة حول تناول أفودارت.

أفودارت والأدوية الأخرى

أخبر طبيبك بما إذا كنت تتناول، أو قد تناولت مؤخرًا، أو ربما تتناول أي أدوية أخرى.

قد تتفاعل بعض الأدوية مع أفودارت، وقد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية. وتشمل تلك الأدوية:

- فيراباميل أو ديلتيازيم** (لعلاج ارتفاع ضغط الدم)
- ريفونافير أو إيندينافير** (لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية)
- إيتراكونازول أو كيتوكونازول** (لعلاج الالتهابات الفطرية)
- نيفازودون** (مضاد اكتئاب)
- حاصرات ألفا** (لعلاج تضخم البروستاتا أو ارتفاع ضغط الدم).

← **أخبر طبيبك** إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية. فقد تحتاج إلى تقليل جرعتك من أفودارت.

استخدام أفودارت مع الطعام والشراب

يمكن تناول أفودارت مع الطعام أو بدون.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة

يجب على النساء الحوامل (أو اللواتي يمكن أن يحملن) تجنب ملامسة الكبسولات التي يحدث بها تسريب. فالإمادة الفَعّالة دوتاستيرياد يمكن امتصاصها من خلال الجلد. وقد يؤثر على النمو الطبيعي لأجنة الذكور. وهذه خطورة كبيرة في أول ١١ أسبوعًا من الحمل.
يجب استخدام واقيات ذكورية خلال الاتصالات الجنسية. تم العثور على دوتاستيرياد في السائل المنوي لدى الرجال الذين يتناولون أفودارت. إذا كانت زوجتك حاملًا أو يمكن أن تحمل، يجب أن تجنبها التعرض لسائلك المنوي.
ويؤكد تحليل السائل المنوي وحجم الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية. ولذلك قد يخفض مستوى الخصوبة لدى الذكور.
ثبت أن أفودارت يقلل عدد الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية. ولذلك قد يخفض مستوى الخصوبة لدى الذكور.

← **يجب استشارة طبيبك** إذا لامست امرأة حامل دوتاستيرياد.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المرجح أن يؤثر أفودارت على قدرتك على القيادة أو تشغيل الآلات.

يحتوي أفودارت على ليسينين يتم الحصول عليه من الصويا

يحتوي هذا الدواء على ليسينين يتم الحصول عليه من الصويا، ولذا فإنه قد يحتوي على زيت الصويا. لا نستخدم هذا المنتج الدوائي إذا كانت لديك حساسية للفول السوداني أو الصويا.

٣- كيفية تناول أفودارت

تناول أفودارت دائمًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي بالضبط. إذا لم تتناوله بانتظام، فقد تتأثر مراقبة مستويات المستضد البروستاتي النوعي وينبغي استشارة طبيبك أو الصيدلي في حالة عدم التأكد من طريقة الاستعمال.

مقدار الجرعة

الجرعة النموذجية هي كبسولة واحدة (تركيز ٠,٥ ملجم) تؤخذ مرة واحدة يوميًا. يجب ابتلاع الكبسولة كاملة مع الماء. لا تمضغ الكبسولة أو تكسرها، قد تصيب ملامسة محتويات الكبسولة بالتهاب في الفم أو الحلق.

يُعد أفودارت علاجًا طويل المدى. ويلاحظ بعض الرجال من البداية تحسُّنًا في الأعراض التي يعانون منها. ولكن قد يحتاج غيرهم إلى تناول أفودارت لمدة ١ أشهر أو أكثر قبل أن يبدأ في إحداث تأثير. واصل تناول أفودارت لأي فترة يحددها طبيبك.

في حالة تجاوز الجرعة اللازمة من أفودارت

استشر طبيبك أو الصيدلي في حالة تناول عدد أكبر من اللازم من كبسولات أفودارت.

في حالة نسيان تناول جرعة أفودارت

لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة. لا تتناول سوى جرعتك التالية في وقتها المعتاد.

لا تتوقف عن تناول أفودارت دون الحصول على استشارة

لا تتوقف عن تناول أفودارت بدون استشارة طبيبك أولاً. قد يلزمك تناول الدواء لمدة تصل إلى ٦ أشهر أو أكثر حتى تلاحظ أي تأثير.

← **إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الصيدلي.**

٤- الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء حدوث آثار جانبية، بالرغم من أنها لا تحدث لجميع الأشخاص.

تفاعلات الحساسية

- يمكن أن تشمل علامات تفاعلات الحساسية ما يلي:
- طفح جلدي** (قد يكون مصحوبًا بحكة)
- شرى** (مثل الطفح القارصي)
- تورم جفني العينين أو الوجه أو الشفتين أو الذراعين أو الساقين.**

← **يجب الاتصال بطبيبك على الفور** إذا أصبت بأي من هذه الأعراض و**توقف عن استخدام أفودارت.**

الآثار الجانبية الشائعة

قد تصيب هذه الآثار رجالًا واحدًا بعد أقصى من بين كل ١٠ رجال يتناولون أفودارت:

- عدم القدرة على الانتصاب أو المحافظة عليه (الضعف الجنسي)، وقد يستمر هذا بعد التوقف عن تناول أفودارت
- انخفاض الرغبة الجنسية (الليبيدو)، وقد يستمر هذا بعد التوقف عن تناول أفودارت
- ضعف في القذف، مثل انخفاض حجم السائل المنوي الذي يتم إفرازه خلال الاتصال الجنسي، وقد يستمر هذا بعد التوقف عن تناول أفودارت
- تضخم أو ألم في الثديين (تندب الرجل)
- دوار عند تناول الدواء مع تامسولوسين.

الآثار الجانبية غير الشائعة

قد تصيب هذه الآثار رجالًا واحدًا بعد أقصى من بين كل ١٠٠ رجل يتناولون أفودارت:

- قصور القلب (انخفاض كفاءة القلب في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وقد تعاني من أعراض مثل ضيق التنفس، والإجهاد الشديد، \ وتورم في الكاحلين والساقين)
- تساقط الشعر (من الجسم عادةً) أو نمو الشعر.

الآثار الجانبية غير المعروفة

يعقد تقييم مخاطر التكرار من البيانات المتوفرة:

- الاكتئاب
- آلم وتورم في الخصيتين.

٥- كيفية تخزين أفودارت

• يجب حفظ هذا الدواء بعيدًا عن مرآى ومناول الأطفال.

• تجنب تخزين أفودارت في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

• لا يجوز استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المضمّن على العبوة الكرتونية أو الشريط الفقاعي المعدني. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور.

لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. استشر الصيدلي بشأن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فهذه الإجراءات ستساعد على حماية البيئة.

٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

المادة الفَعّالة هي دوتاستيرياد. تحتوي كل كبسولة لينة على ٠,٥ ملجم من دوتاستيرياد.

المكوّنات الأخرى هي:

تحتوي الكبسولة من الداخل على أحادي-ثنائي-جليسيريدات لحمض الكابريليك/مض الكابريلك وبوتيل هيدروكسي تولىين (E321)

• غلاف الكبسولة، جيلاتين، جليسيرول، ثنائي أكسيد التيتانيوم (E17١)، أكسيد الحديد الأصفر (E١72)، جليسيريدات ثلاثية (متوسطة الحلقات)، ليسينين (قد يحتوي على زيت الصويا).

شُكل أفودارت ومحتويات العبوة

كبسولات أفودارت اللينة عبارة عن كبسولات جيلاتينية لينة صفراء ومستطيلة وغير شفافة ومطبوع عليها GX CE2. وهي متوفرة في عبوات بها ٣ و٥ و ١٠ و٢٠ كبسولة. قد لا تتوفر بعض أحجام العبوات.

توزيع شركة فارماجين-لبنان

بإجازة من شركة GalxoSmithKline Export Ltd., UK

العلامات التجارية مملوكة أو مرُخصة لمجموعة شركات GSK

© ٢٠١٥ حقوق الطبع محفوظة لمجموعة شركات GSK أو الجهات المرُخص لها

للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمنتجات أو الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام منتجات شركة GSK، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: gulf.safety@gsk.com

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في مارس ٢٠٢٠.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغي وضره
- لا تقم بتعديل الجرعة المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصيدالة العرب



Package Leaflet: information for the user

Avodart 0.5 mg soft capsules

Dutasteride

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

1. What Avodart is and what it is used for
2. What you need to know before you take Avodart
3. How to take Avodart
4. Possible side effects
5. How to store Avodart
6. Contents of the pack and other information

1- What Avodart is and what it is used for

Avodart is used to treat men with an enlarged prostate (*benign prostatic hyperplasia*)

- a non-cancerous growth of the prostate gland, caused by producing too much of a hormone called dihydrotestosterone.

The active ingredient is dutasteride. It belongs to a group of medicines called 5-alpha reductase inhibitors.

As the prostate grows, it can lead to urinary problems, such as difficulty in passing urine and a need to go to the toilet frequently. It can also cause the flow of the urine to be slower and less forceful. If left untreated, there is a risk that your urine flow will be completely blocked (*acute urinary retention*). This requires immediate medical treatment. In some situations surgery is necessary to remove or reduce the size of the prostate gland. Avodart lowers the production of dihydrotestosterone, which helps to shrink the prostate and relieve the symptoms. This will reduce the risk of acute urinary retention and the need for surgery.

Avodart may also be used with another medicine called tamsulosin (used to treat the symptoms of an enlarged prostate).

2- What you need to know before you take Avodart

Do not take Avodart

- if you are allergic to dutasteride, other 5-alpha reductase inhibitors, soya, peanut or to any of the other ingredients of this medicine (listed in section ٥)
- **if you have a severe liver disease.**

→ If you think any of these apply to you, **don't take** this medicine until you have checked with your doctor.

This medicine is for men only. It must not be taken by women, children or adolescents.

Warnings and Precautions

Talk to your doctor before taking Avodart.

• **Make sure your doctor knows about liver problems.** If you have had any illness affecting your liver, you may need some additional check-ups while you are taking Avodart.

• **Women, children and adolescents** must not handle leaking Avodart capsules, because the active ingredient can be absorbed through the skin. **Wash the affected area immediately** with soap and water if there is any contact with the skin.

• **Use a condom during sexual intercourse.** Dutasteride has been found in the semen of men taking Avodart. If your partner is or may be pregnant, you must avoid exposing her to your semen as dutasteride may affect the normal development of a male baby. Dutasteride has been shown to decrease sperm count, semen volume and sperm motility. This could reduce your fertility.

• **Avodart affects a blood test for PSA** (prostate-specific antigen), which is sometimes used to detect prostate cancer. Your doctor should be aware of this effect and can still use the test to detect prostate cancer. If you are having a blood test for PSA, tell your doctor that you are taking Avodart. **Men taking Avodart should have their PSA tested regularly.**

• In a clinical study of men at increased risk of prostate cancer, men taking Avodart had a **serious form of prostate cancer more often** than men who did not take Avodart. The effect of Avodart on this serious form of prostate cancer is not clear.

• **Avodart may cause breast enlargement and tenderness.** If this becomes troublesome, or if you notice **breast lumps or nipple discharge** you should talk to your doctor about these changes as these may be signs of a serious condition, such as breast cancer.

→ **Contact your doctor or pharmacist** if you have any questions about taking Avodart.

Other medicines and Avodart

Tell your doctor if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.

Some medicines can react with Avodart and may make it more likely that you'll have side-effects. These medicines include:

- **verapamil or diltiazem** (for high blood pressure)
- **ritonavir or indinavir** (for HIV)
- **itraconazole or ketoconazole** (for fungal infections)
- **nefazodone** (an antidepressant)
- **alpha-blockers** (for enlarged prostate or high blood pressure).

→ **Tell your doctor** if you are taking any of these medicines. Your dose of Avodart may need to be reduced.

Avodart with food and drink

Avodart can be taken with or without food.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

Women who are pregnant (or may be) must not handle leaking capsules. Dutasteride is absorbed through the skin and can affect the normal development of a male baby. This is a particular risk in the first 16 weeks of pregnancy.

Use a condom during sexual intercourse. Dutasteride has been found in the semen of men taking Avodart. If your partner is or may be pregnant, you must avoid exposing her to your semen.

Avodart has been shown to reduce sperm count, semen volume and sperm movement. Therefore male fertility may be reduced.

→ **Contact your doctor** for advice if a pregnant woman has come into contact with dutasteride.

Driving and using machines

Avodart is unlikely to affect your ability to drive or operate machinery.

Avodart contains lecithin from soya

This medicine contains lecithin from soya, which may contain soya oil. If you are allergic to peanut or soya, do not use this medicinal product.

3- How to take Avodart

Always take Avodart exactly as your doctor or pharmacist has told you to. If you do not take it regularly the monitoring of your PSA levels may be affected. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to take

The recommended dose is one capsule (0.5 mg) taken once a day. Swallow the capsules whole with water. Do not chew or break open the capsule. Contact with the contents of the capsules may make your mouth or throat sore.

Avodart is a long-term treatment. Some men notice an early improvement in their symptoms. However, others may need to take Avodart for 6 months or more before it begins to have an effect. Keep taking Avodart for as long as your doctor tells you.

If you take more Avodart than you should

Contact your doctor or pharmacist for advice if you take too many Avodart capsules.

If you forget to take Avodart

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Just take your next dose at the usual time.

Don't stop Avodart without advice

Don't stop taking Avodart without talking to your doctor first. It may take up to 6 months or more for you to notice an effect.

→ **If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.**

4- Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Allergic reaction

The signs of allergic reactions can include:

- **skin rash** (which can be itchy)
- **hives** (like a nettle rash)
- **swelling of the eyelids, face, lips, arms or legs.**

→ **Contact your doctor immediately** if you get any of these symptoms, and **stop using Avodart.**

Common side effects

These may affect up to 1 in 10 men taking Avodart:

- not able to achieve or maintain an erection (impotence), this may continue after you stop taking Avodart
- decreased sex drive (libido), this may continue after you stop taking Avodart
- difficulty with ejaculation, such as a decrease in the amount of semen released during sex, this may continue after you stop taking Avodart
- breast enlargement or tenderness (gynecomastia)
- dizziness when taken with tamsulosin.

Uncommon side effects

These may affect up to 1 in 100 men taking Avodart:

- heart failure (heart becomes less efficient at pumping blood around the body. You may have symptoms such as shortness of breath, extreme tiredness and swelling in your ankles and legs)
- hair loss (usually from the body) or hair growth.

Not known side effects

The frequency cannot be estimated from the available data:

- depression
- pain and swelling in your testicles.

5- How to store Avodart

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Don't store Avodart above 30°C
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton or the foil blister strip. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6- Contents of the pack and other information

What Avodart contains

The active substance is dutasteride. Each soft capsule contains 0.5 mg dutasteride.

The other ingredients are:

- inside the capsule: mono-di-glycerides of caprylic/capric acid and butylated hydroxytoluene (E321).
- capsule shell: gelatin, glycerol, titanium dioxide (E17١), iron oxide yellow (E172), triglycerides (medium chain), lecithin (may contain soya oil).

What Avodart looks like and contents of the pack

Avodart soft capsules are oblong opaque, yellow, soft gelatin capsules marked with GX CE2. They are available in packs of 10, 30, 50, 60 and 90 capsules. Not all pack sizes may be available.

Packed by **Pharmaline**-Lebanon

licensed by **GlaxoSmithKline Export Ltd., UK**

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

© 2020 GSK group of companies or its licensor.

To report Product Complaints or Adverse Event/s associated with the use of GSK products, please contact us via: gulf.safety@gsk.com

This leaflet was last revised in **March 2020**.

This is a Medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

09/2020 905293-A

DESTINATION DIMENSIONS COLORS

LOCAL
180 x 690 mm
BLACK