

Notice: Information de l'utilisateur

ZENTEL 400 mg comprimé

Albendazole

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin pour une répétition du traitement si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après la prise du traitement initial.

Dans cette notice :

- 1. Qu'est-ce que ZENTEL 400 mg comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?**
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZENTEL 400 mg comprimé**
- 3. Comment prendre ZENTEL 400 mg comprimé ?**
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
- 5. Comment conserver ZENTEL 400 mg comprimé**
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations.**

1. QU'EST-CE QUE ZENTEL 400 mg comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ZENTEL contient la substance active albendazole qui appartient à un groupe de médicaments appelés les antihelminthiques.

ZENTEL est utilisé/indiqué pour le traitement des infections suivantes causées par des parasites/protozoaires intestinaux sensibles :

- oxyurose (entérobiase)
- ankylostomose (ankylostomose et nécatorose)
- hyménolépiose
- taeniasis
- anguillulose
- ascaridiose
- trichocéphalose
- clonorchiose et opisthorchiase (infections à *Opisthorchic viverrini* et/ou *Clonorchis sinensis*)
- larva migrans cutanée
- giardiose chez l'enfant

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZENTEL 400 mg comprimé ?

Ne prenez jamais ZENTEL 400 mg comprimé

- si vous êtes allergique (*hypersensible*) à l'albendazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (répertoriés dans la rubrique 6).
- si vous êtes enceinte.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ZENTEL 400 mg comprimé.

Les femmes en âge de procréer devraient commencer le traitement dans les 10 premiers jours à partir du début de leur menstruation ou immédiatement après un test de grossesse négatif, afin d'éviter d'administrer l'albendazole au début de la grossesse,

Si vous ressentez des maux de tête sévères, des nausées et des vomissements, des crises et/ou des problèmes de vue après la prise de ce médicament, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament peut provoquer des troubles hépatiques. Veuillez informer votre médecin ou pharmacien si vous remarquez le jaunissement de la peau ou des yeux.

Si on vous a diagnostiqué des problèmes hépatiques ou rénaux, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et ZENTEL 400 mg comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ne prenez jamais ZENTEL si vous êtes enceinte.

Si vous allaitez, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

ZENTEL 400 mg comprimé contient du lactose et un colorant azoïque.

3. Comment prendre ZENTEL 400 mg comprimé

Posologie

Veuillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 400 mg en prise unique pour les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans et 200 mg pour les enfants âgés de 1 à 2 ans.

Ne dépassez pas la dose unique maximale quotidienne recommandée pour les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans (de 400 mg) ou pour les enfants âgés de 1 à 2 ans (200 mg).

Si vous ressentez toujours des symptômes après la prise d'une dose unique, veuillez demander conseil à votre médecin pour un traitement approfondi.

<i>Infection</i>	<i>Âge</i>	<i>Posologie habituelle</i>	<i>Durée de la dose</i>	<i>Posologie maximale recommandée</i>
Oxyurose Ankylostomose Trichocéphalose Ascariidose	<i>Adultes et enfants de plus de 2 ans</i>	<i>400 mg</i>	<i>prise unique</i>	<i>400 mg en prise unique</i>
	<i>enfants âgés de 1 à 2 ans</i>	<i>200 mg</i>	<i>prise unique</i>	<i>200 mg en prise</i>
Anguillulose Hyménolépiose* Taeniasis présumées ou confirmées	<i>Adultes et enfants de plus de 2 ans</i>	<i>400 mg</i>	<i>Une fois par jour pendant 3 jours successifs *En cas d'hyménolépiose confirmée, une répétition du traitement dans 10 à 21 jours est recommandée</i>	<i>400 mg par jour (1200 mg pendant 3 jours successifs)</i>
Clonorchiose et opisthorchiase	<i>Adultes et enfants de plus de 2 ans</i>	<i>400 mg</i>	<i>Deux fois par jour pendant 3 jours</i>	<i>800 mg par jour (2400 mg sur une période de 3 jours)</i>
Larva migrans cutanée	<i>Adultes et enfants de plus de 2 ans</i>	<i>400 mg</i>	<i>Une fois par jour pendant 1 à 3 jours</i>	<i>400 mg par jour (jusqu'à 1200 mg sur une période de 3 jours)</i>
Giardiose	<i>Enfants âgés de 2 à 12 ans uniquement</i>	<i>400 mg</i>	<i>Une fois par jour pendant 5 jours</i>	<i>400 mg par jour (2000 mg au cours d'une période de 5 jours)</i>

Mode d'administration

Voie orale.

Il est préférable de prendre ZENTEL à la même heure chaque jour.

Vous pouvez prendre ZENTEL avec ou sans nourriture.

Avalez les comprimés avec de l'eau. Pour certaines personnes, en particulier les jeunes enfants, qui peuvent avoir du mal à avaler les comprimés en entier, écrasez ou mâchez le comprimé et prenez le avec un peu d'eau.

La forme suspension buvable peut également être utilisée

Si vous avez pris plus de ZENTEL 400 mg que vous n'auriez dû :

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ZENTEL 400 mg comprimé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous oublié de prendre.

Prenez la dose dès que possible, puis prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

- maux de tête ou sensations vertigineuses
- maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhées

Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

- éruption cutanée, prurit, urticaire
- élévations des enzymes hépatiques (perturbations du bilan hépatique)

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez le jaunissement de la peau ou des yeux.

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) :

- Graves éruptions cutanées avec ampoules, enflure et desquamation.

Déclaration des effets indésirables :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ZENTEL 400 mg comprimé

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver en dessous de 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ZENTEL 400 mg comprimé

La substance active est :

Albendazole

.....400,00 mg

Pour 1 comprimé

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, croscarmellose sodique, povidone, laurilsulphate de sodium, Couleur FD&C Jaune#6 Laque d'aluminium 20-24% FDA, saccharine sodique, stéarate de magnésium, arôme vanille, arôme fruit de la passion, arôme orange

Qu'est-ce que ZENTEL 400 mg comprimé et contenu de l'emballage extérieur

Comprimé sous blister PVC/PVDC/Aluminium. Boîte de 1 comprimé.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Laboratoire GlaxoSmithKline
23 RUE FRANCOIS JACOB
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

Fabricant:

Haleon South Africa (Pty) Ltd
11 Hawkins Avenue
Epping Industria One
Cape Town
Western Cape, 7450
République d'Afrique du Sud

Médicaments non soumis à prescription médicale

Numéro de version : CxGDS 02

Date: 3 juin 2024

Les marques appartiennent ou sont concédées aux sociétés du groupe GSK.

@2024 Sociétés du groupe GSK ou ses concédants.