

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Lamictal 2 mg comprimate masticabile/dispersabile

Lamictal 5 mg comprimate masticabile/dispersabile

Lamotrigină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luăți acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lamictal și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luăți Lamictal
3. Cum să luăți Lamictal
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lamictal
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lamictal și pentru ce se utilizează

Lamictal aparține unei grupe de medicamente denumită *antiepileptice*. Este utilizat pentru a trata două afecții – **epilepsia și tulburarea bipolară**.

Lamictal tratează epilepsia prin blocarea semnalelor din creier care declanșează crizele epileptice (convulsiile).

- Pentru adulți și copii cu vârstă de 13 ani și peste, Lamictal poate fi utilizat singur sau cu alte medicamente, pentru tratamentul epilepsiei. Lamictal poate fi de asemenea folosit cu alte medicamente pentru tratarea convulsiilor care apar în cadrul unei afecții denumită sindrom Lennox-Gastaut.
- Pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 și 12 ani, Lamictal poate fi utilizat împreună cu alte medicamente, pentru a trata aceste afecții. Poate fi utilizat singur pentru tratamentul unui tip de epilepsie cunoscut sub numele de absențe tipice.

Lamictal este utilizat de asemenea pentru tratamentul tulburării bipolare.

Persoanele cu tulburare bipolară (denumită uneori *depresie maniacală*) prezintă schimbări extreme ale dispoziției, cu perioade de manie (stare de excitație sau euforie) alternând cu perioade de depresie (stare de tristețe adâncă sau disperare). Pentru adulții cu vârstă peste 18 ani, Lamictal poate fi utilizat singur sau împreună cu alte medicamente, pentru prevenirea perioadelor de depresie care apar în tulburarea bipolară. Nu se știe încă cum acționează Lamictal la nivelul creierului pentru a produce acest efect.

2. Ce trebuie să știți înainte să luăți Lamictal

Nu luăți Lamictal:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la lamotrigină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).



Dacă vă aflați în această situație:

- ⇒ Spuneți-i medicului dumneavoastră și nu luați Lamictal.

Atenționări și precauții

Spuneți medicul dumneavoastră sau farmacistului înainte să luați Lamictal:

- dacă aveți orice fel de probleme cu rinichii
- dacă v-a apărut vreodată o erupție pe piele după ce ați luat lamotrigină sau alte medicamente pentru tulburarea bipolară sau epilepsie
- dacă ați făcut vreodată meningită după ce ați luat lamotrigină (*citiți descrierea acestor simptome la pct. 4 al acestui prospect: Rare reacții adverse*)
- dacă luați deja medicamente care conțin lamotrigină

Dacă vă aflați în oricare dintre aceste situații:

- ⇒ Spuneți-i medicului dumneavoastră, care poate decide scăderea dozei, sau că Lamictal nu este potrivit pentru dumneavoastră.

Informații importante despre reacții adverse care pot pune viața în pericol

Un număr mic de oameni care iau Lamictal fac o reacție alergică sau reacții la nivelul pielii care pot pune viața în pericol, care pot duce la probleme mai grave dacă nu sunt tratate. Acestea pot include sindromul Stevens-Johnson (SSJ), necroliză epidernică toxică (NET) și reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemică (DRESS). Trebuie să cunoașteți aceste simptome pentru a le putea remarca cât timp sunteți sub tratament cu Lamictal.

- ⇒ *Citiți descrierea acestor simptome în secțiunea 4 a acestui prospect "Reacții adverse care pot pune viața în pericol: cereți imediat ajutorul medicului"*

Gânduri de auto-vătămare sau sinucidere

Medicamentele anti-epileptice sunt utilizate pentru a trata diverse boli, inclusiv epilepsia și tulburarea bipolară.

Persoanele cu tulburare bipolară pot prezenta uneori gânduri de auto-vătămare sau sinucidere. Dacă aveți tulburare bipolară, este mai probabil să gândiți în acest fel:

- când începeți pentru prima oară tratamentul
- dacă ați avut în trecut gânduri de auto-vătămare sau sinucidere
- dacă aveți vârstă sub 25 de ani

Dacă aveți gânduri sau experiențe triste, sau dacă observați că vă simțiți mai rău sau că apar simptome noi în timp ce luați Lamictal:

- ⇒ **Mergeți la un medic cât mai curând posibil sau mergeți la cel mai apropiat spital pentru ajutor.**

La un număr mic de pacienți tratați cu medicamente antiepileptice precum Lamictal s-a constatat apariția unor gânduri de auto-vătămare sau de sinucidere. În cazul în care vă apar astfel de gânduri, contactați-vă imediat medicul, indiferent de moment.

Dacă luați Lamictal pentru epilepsie

Crizele din unele tipuri de epilepsie se pot agrava ocazional sau se pot produce mai frecvent chiar dacă luați Lamictal. Unii pacienți pot prezenta crize severe, care pot provoca probleme grave de sănătate. Dacă crizele survin mai frecvent sau dacă prezentați o criză severă când luați Lamictal:

- ⇒ **Mergeți la un medic cât mai curând posibil.**

Lamictal nu trebuie administrat persoanelor cu vârstă sub 18 ani pentru tratamentul tulburării bipolare. Medicamentele pentru tratamentul depresiei și altor probleme de sănătate mintală determină creșterea riscului de gânduri și comportamente suicidare la copii și adolescenți

cu vârsta sub 18 ani.

Lamictal împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente din plante și medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Medicul dumneavoastră trebuie să fie informat dacă luați alte medicamente pentru tratamentul epilepsiei sau al altor probleme de sănătate mintală. Această informație este necesară pentru a se stabili dacă vi se administreză doza corectă de Lamictal. Aceste medicamente includ:

- oxcarbazepină, felbamat, gabapentină, levetiracetam, pregabalin, topiramat sau zonisamidă, utilizate pentru tratamentul epilepsiei
- litiu, olanzapină sau aripiprazol utilizate pentru tratamentul problemelor de sănătate mintală
- bupropionă, utilizată pentru tratamentul problemelor de sănătate mintală sau pentru oprirea fumatului

⇒ Spuneți-i medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre acestea.

Anumite medicamente interacționează cu Lamictal sau fac mai probabilă apariția reacțiilor adverse. Acestea includ:

- valproat, utilizat pentru tratamentul epilepsiei și problemelor de sănătate mintală
- carbamazepină, utilizată pentru tratamentul epilepsiei și problemelor de sănătate mintală
- fenitoină, primidonă sau fenobarbital, utilizate pentru tratamentul epilepsiei
- risperidonă, utilizată pentru tratamentul problemelor de sănătate mintală
- rifampicină, care este un antibiotic
- medicamente, utilizate pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) (o combinație de lopinavir și ritonavir sau atazanavir și ritonavir)
- contraceptive hormonale, precum contraceptive orale combine (a se vedea mai jos).

⇒ Spuneți-i medicului dumneavoastră dacă luați, ați început să luați sau ați întrerupt administrarea oricărui dintre acestea.

Contraceptivele hormonale (cum ar fi contraceptive orale combine) pot influența modul în care acționează Lamictal

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să utilizați un anume tip de contraceptiv hormonal, sau altă metodă de contraccepție, precum prezervative, diafragmă sau sterilet. Dacă utilizați un contraceptiv hormonal precum contraceptive orale combine, medicul dumneavoastră poate să vă recolzeze probe de sânge pentru a verifica concentrația de Lamictal. Dacă folosiți un contraceptiv hormonal sau plănuiești să începeți utilizarea unuia:

⇒ Discutați cu medicul dumneavoastră, care vă va prezenta metode contraceptive adecvate pentru dumneavoastră.

Lamictal poate influența de asemenea modul în care acționează contraceptivele hormonale, deși este improbabil ca acest lucru să le facă mai puțin eficace. Dacă utilizați un contraceptiv hormonal și remarcăți modificări ale ciclului menstrual, cum ar fi sângerări neregulate sau pătare între cicluri:

⇒ Spuneți-i medicului dumneavoastră. Acestea pot fi semne că Lamictal afectează modul în care acționează contraceptivul dumneavoastră.

Sarcina și alăptarea

⇒ Dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravida sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

- Nu trebuie să întrerupeți tratamentul fără să fi discutat în prealabil despre acest lucru cu medicul dumneavoastră. Acest lucru este deosebit de important dacă sunteți bolnav de epilepsie.
- Sarcina poate de asemenea modifica eficacitatea Lamictal, astfel încât să fie necesar să efectuați niște analize de sânge și doza dumneavoastră de Lamictal să fie modificată.
- Poate exista un risc ușor crescut de defecte congenitale, inclusiv despiciatură labială sau palatină, dacă Lamictal este luat în primele 3 luni de sarcină.
- Medicul dumneavoastră vă poate sfătui să luați suplimente de acid folic dacă plănuiuți să rămâneți gravidă și în timpul sarcinii.

⇒ **Dacă alăptați sau dacă plănuiuți să alăptați, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.** Substanța activă din Lamictal trece în lapte și vă poate afecta copilul. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră despre riscurile și beneficiile alăptării în timp ce luați Lamictal și vă va verifica periodic copilul dacă decideți să alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lamictal poate provoca amețeli și vedere dublă.

⇒ **Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje decât dacă sunteți sigur că nu sunteți afectat.**

Dacă aveți epilepsie, discutați cu medicul dumneavoastră în legătură cu conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor.

3. Cum să luați Lamictal

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Cât Lamictal să luați

Poate să dureze un timp până la găsirea celei mai bune doze de Lamictal pentru dumneavoastră. Doza pe care o luați va depinde de:

- vârsta dumneavoastră
- dacă luați Lamictal împreună cu alte medicamente
- dacă aveți orice fel de probleme cu rinichii sau ficatul.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie o doză mică la începutul tratamentului și va crește treptat doza în următoarele săptămâni până când atingeți o doză care are efect la dumneavoastră (denumită *doza eficace*). **Niciodată nu luați mai mult Lamictal decât v-a spus medicul.**

Doza uzuală eficace de Lamictal pentru adulți și copii cu vârstă de 13 ani sau peste este între 100 mg și 400 mg pe zi.

Pentru copii cu vârstă între 2 și 12 ani, doza eficace depinde de greutatea lor corporală – de obicei, este între 1 mg și 15 mg pentru fiecare kg de greutate corporală a copilului, până la o doză de întreținere maximă de 200 mg pe zi.

Lamictal nu este recomandat copiilor cu vârstă sub 2 ani.

Cum să luați doza dumneavoastră de Lamictal

Luați doza dumneavoastră de Lamictal o dată sau de două ori pe zi, după cum vă recomandă medicul. Poate fi luată cu sau fără alimente.

- **Luați întotdeauna doza completă** pe care v-a prescris-o medicul.
Niciodată nu luați doar o parte dintr-un comprimat.

De asemenea, medicul dumneavoastră poate să vă recomande încěperea sau întreruperea administrařii altor medicamente, în funcție de afecțiunea pentru care sunteți tratat și de modul în care răspundeți la tratament.

Lamictal comprimate masticabile/dispersabile pot fi înghițite întregi cu puțină apă, mestecate sau dizolvate în apă pentru a obține un medicament lichid.

Dacă mestecați comprimatul:

Este posibil să fie necesar să bei puțină apă în același timp, pentru a ajuta comprimatul să se dizolve în gură. Bei apoi ceva mai multă apă pentru a fi sigur că toată cantitatea de medicament a fost înghițită.

Pentru a face un medicament lichid:

- Puneți comprimatul într-un pahar cu suficientă apă astfel încât cel puțin să acopere tot comprimatul.
- Fie agitați să se dizolve sau aşteptați până când comprimatul este complet dizolvat.
- Bei toată cantitatea de lichid.
- Adăugați încă puțină apă în pahar și bei-o, pentru a vă asigura că nu a rămas nicio urmă de medicament în pahar.

Dacă luați mai mult Lamictal decât trebuie

Dacă oricine ia mai mult Lamictal decât trebuie:

- ⇒ **Contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital de urgență.** Dacă este posibil arătați-le cutia de Lamictal.

Dacă luați prea mult Lamictal, este mult mai probabil să aveți reacții adverse grave care ar putea fi letale.

O persoană care a luat mai mult decât trebuie din Lamictal poate avea oricare dintre aceste simptome:

- Mișcări oculare rapide, necontrolabile (*nistagmus*)
- Neîndemânare și lipsă de coordonare, afectarea echilibrului (*ataxie*)
- Schimbări ale ritmului cardiac (detectate de obicei pe EKG)
- Pierderea conștienței, convulsii sau comă.

Dacă uitați să luați o singură doză de Lamictal

- ⇒ **Nu luați comprimate în plus** pentru a compensa o doză uitată. Luați-vă următoarea doză la ora obișnuită.

Dacă uitați să luați mai multe doze de Lamictal

- ⇒ **Cereți sfatul medicului dumneavoastră în legătură cu modul în care se începe din nou administrarea.** Este important să faceți acest lucru.

Nu întrerupeți administrarea de Lamictal fără recomandare

Lamictal trebuie luat atâtă timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră. Nu întrerupeți tratamentul decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.

Dacă luați Lamictal pentru epilepsie

Pentru a întrerupe administrarea de Lamictal, este important să reduceți treptat doza, pe durata a 2 săptămâni. Dacă întrerupeți brusc administrarea de Lamictal, epilepsia dumneavoastră poate reveni

sau se poate agrava.

Dacă luați Lamictal pentru tulburarea bipolară

Lamictal își poate face efectul după un anumit timp, deci nu este probabil să vă simțiți bine imediat. Dacă opriți administrarea de Lamictal, doza dumneavoastră nu va trebui redusă treptat. Dar tot trebuie să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră, dacă doriți să întrerupeți administrarea de Lamictal.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele:

Reacții care pot pune viața în pericol: cereți imediat ajutorul medicului

Un număr mic de oameni care iau Lamictal fac o reacție alergică sau reacții la nivelul pielii care pot pune viața în pericol, care pot duce la probleme mai grave dacă nu sunt tratate.

Aceste simptome apar cu precădere în primele luni de tratament cu Lamictal, mai ales dacă doza inițială este prea mare sau este crescută prea brusc, sau dacă Lamictal este administrat cu un alt medicament numit *valproat*. Unele din aceste simptome sunt mai frecvente în cazul copiilor și din această cauză părinții trebuie să fie atenți pentru a le putea sesiza la timp.

Simptomele acestor reacții includ:

- **erupții sau roșeață la nivelul pielii**, care se pot transforma în reacții grave la nivelul pielii care pun viața în pericol, cum ar fi erupții cutanate extinse cu pustule și descuamări ale pielii, care apar în special în jurul gurii, nasului, ochilor și organelor genitale (*Sindrom Stevens-Johnson*) și exfoliere extinsă a pielii (pe mai mult de 30 % din suprafața corpului – *necroliză toxică epidermică*) sau erupție cutanată extinsă cu implicare hepatică, sanguină și a altor organe (reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice care mai este cunoscută și sub denumirea de sindrom de hipersensibilitate DRESS)
- **ulcere la nivelul gurii, gâtului, nasului sau organelor genitale**
- **dureri la nivelul gurii sau înroșirea sau umflarea ochilor (conjunctivită)**
- **creșterea temperaturii** (febră), simptome asemănătoare gripei sau somnolență
- **umflare în jurul feței sau umflarea ganglionilor** de la nivelul gâtului, axilei sau zonei inghinală
- **sângerare sau învinetare neașteptată**, sau degetele dumneavoastră devin albastre
- **durere în gât** sau mai multe infecții (cum ar fi răcelile) decât de obicei.
- **valori crescute ale enzimelor hepatici observate la analizele de sânge**
- **creșterea unui tip de celule albe din sânge (ezinofilie)**
- **mărirea ganglionilor limfatici**
- **affectarea organelor, inclusiv ficat și rinichi.**

În multe cazuri, aceste simptome vor fi semne de reacții adverse mai puțin grave. **Dar trebuie să fiți conștient de faptul că vă pot pune viața în pericol și dacă nu sunt tratate, se pot transforma în afecțiuni și mai grave**, cum ar fi insuficiența unui organ. Dacă remarcăți oricare dintre aceste simptome:

➔ **Mergeți imediat la un medic.** Medicul dumneavoastră poate decide să vă efectueze analize pentru a vă verifica ficatul, rinichii sau săngele și vă poate spune să întrerupeți administrarea de Lamictal. Dacă ați făcut sindrom Stevens-Johnson sau necroliză toxică epidermică, medicul dumneavoastră vă va spune că trebuie să nu mai luați niciodată lamotrigină.

Reacții adverse foarte frecvente

Acestea pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane:

- durere de cap
- erupție pe piele.

Reacții adverse frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane:

- agresivitate sau iritabilitate
- senzație de somnolență sau moleșală
- senzație de amețeală
- frisoane sau tremurături
- dificultăți de somn (*insomnie*)
- senzație de agitație
- diaree
- uscăciunea gurii
- senzație de rău (*greață*) sau stare de rău (*vârsături*)
- senzație de oboseală
- durere de spate, de articulații, sau în altă parte.

Reacții adverse mai puțin frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 100 persoane:

- neîndemânare și lipsă de coordonare (*ataxie*)
- vedere dublă sau vedere încețoșată

Reacții adverse rare

Acestea pot afecta până la 1 din 1000 persoane:

- o afecțiune a pielii care poate pune viața în pericol (*sindrom Stevens-Johnson*): vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4).
- un grup de simptome care include: febră, greață, vârsături, dureri de cap, rigiditate la nivelul gâtului și sensibilitate crescută la luminăstrălucitoare.
Acele simptome pot fi provocate de o inflamație a membranelor care acoperă creierul și măduva spinării (*meningită*). Aceste simptome dispar în general la oprirea tratamentului; totuși dacă aceste simptome persistă sau se înrăutățesc, contactați-vă medicul.
- mișcări rapide, necontrolabile ale ochilor (*nistagmus*)
- mâncărime la nivelul ochilor cu secreții și cruste la nivelul pleoapelor (*conjunctivită*).

Reacții adverse foarte rare

Acestea pot afecta până la 1 din 10000 persoane:

- o reacție la nivelul pielii care poate pune viața în pericol (*necroliză epidermică toxică*): (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemicе (DRESS): (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- creșterea temperaturii (febră): (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- umflarea în jurul feței (edem) sau umflarea ganglionilor la nivelul gâtului, axilei sau zonei inghinală (limfadenopatie): (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- modificări ale funcției hepaticе, care se va vedea în analizele de sânge sau insuficiență hepatică: (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- o tulburare gravă a coagulării sângeului, care poate provoca sângerări sau învînețiri neașteptate (coagулare intravasculară diseminată): (vezi de asemenea informațiile incluse la începutul pct. 4)
- modificări care se pot vedea în analizele de sânge – inclusiv scăderea numărului de globule

- roșii (*anemie*), scăderea numărului de globule albe (*leucopenie, neutropenie, agrāmuloцитозă*), scăderea numărului de trombocite (*trombocitopenie*), scăderea numărului tuturor acestor tipuri de celule din sânge (*pancitopenie*) și o tulburare a măduvei osoase hematogene denumită *anemie aplastică*
- halucinații ('vederea' sau 'auzirea' de lucruri care nu există în realitate)
 - confuzie
 - senzație de "clătinare" sau de dezechilibru când vă deplasați
 - mișcări necontrolate ale corpului (*ticuri*), spasme musculare necontrolabile care afectează ochii, capul și toracele (*coreoatetoză*) sau alte mișcări neobișnuite ale corpului ca spasme, tremor sau rigiditate
 - la persoanele care au deja epilepsie, crizele pot să apară mai frecvent
 - la persoanele care au deja boala Parkinson, agravarea simptomelor
 - reacții asemănătoare lupusului (simptomele pot include dureri de articulații sau de spate care pot fi uneori însoțite de febră și/sau stare generală de rău).

Alte reacții adverse

Alte reacții adverse au afectat un număr mic de persoane, însă frecvența exactă de apariție a acestora este necunoscută:

- Au fost raportate cazuri de tulburări la nivelul oaselor, inclusiv osteopenie și osteoporoză (subțierea osului) și fracturi. Verificați împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă luați tratament antiepileptic pe termen lung, dacă aveți antecedente de osteoporoză sau dacă luați steroizi.
- Coșmaruri.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lamictal

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister, cutie sau flacon. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Lamictal nu necesită condiții speciale pentru păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lamictal comprimate masticabile/dispersabile

Substanța activă este lamotrigină.

Fiecare comprimat masticabil/dispersabil conține lamotrigină 2 mg.

Fiecare comprimat masticabil/dispersabil conține lamotrigină 5 mg.

Celelalte componente sunt: carbonat de calciu, hidroxipropil celuloză parțial substituită, silicat de aluminiu și magneziu, amidonglicolat de sodiu (tip A), povidonă K30, zahără sodică, stearat de magneziu, aromă de coacăze negre.

Cum arată Lamictal comprimate masticabile/dispersabile și conținutul ambalajului

Comprimatele masticabile/dispersabile de Lamictal (2 mg și 5 mg) sunt de culoare albă sau aproape albă și pot fi ușor marmorate. Ele miros a coacăze negre.

Comprimatele masticabile/dispersabile de Lamictal 2 mg sunt comprimate rotunde. Sunt marcate pe una din fețe cu LTG deasupra numărului 2 iar pe cealaltă față cu două elipse suprapuse în unghi drept.

Fiecare ambalaj conține un flacon cu 30 comprimate masticabile/dispersabile.

Comprimatele masticabile/dispersabile de Lamictal 5 mg sunt alungite cu mărgini curbe. Ele sunt marcate cu 'GS CL2' pe una din fețe și cu '5' pe cealaltă.

Fiecare ambalaj conține blister cu 30 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

The Wellcome Foundation Limited,
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Marea Britanie

Fabricantul

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Polonia

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>

Suplimentar, despre apariția reacțiilor adverse după administrarea medicamentului, Vă rugăm să raportați la adresa de e-mail: oax70065@gsk.com.

Reclamațiile cu privire la calitatea medicamentelor se primesc la adresa de e-mail reclamatie@tetis.mdsau la numărul de telefon +373 22 40 64 08.