

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**АНОРО ЕЛЛІПТА**  
**(ANORO ELLIPTA)**

**Склад:**

*діючі речовини:* умеклідиніум, вілантерол;

1 доза, що доставляється, містить 55 мкг умеклідиніуму (у формі броміду) і 22 мкг вілантеролу (у формі трифенатату);

це відповідає попередньо розподіленій дозі 74,2 мкг умеклідиніуму броміду і 25 мкг вілантеролу (у формі трифенатату);

*допоміжні речовини:* лактоза, моногідрат; магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Порошок для інгаляцій.

*Основні фізико-хімічні властивості:* пластиковий інгалятор зі світло-сірим корпусом, червоним ковпачком розпилювача та лічильником доз, упакований в лоток з фольги, що містить пакетик з вологопоглиначем. Лоток запаяний відривною кришкою. Інгалятор містить дві стрічки по 30 рівномірно розподілених блістерів, кожен з яких містить білий порошок.

**Фармакотерапевтична група.** Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Адренергічні препарати в комбінації з антихолінергічними препаратами, включаючи потрійні комбінації з кортикостероїдами. Вілантерол та умеклідиніуму бромід.

Код АТХ R03A L03.

***Фармакологічні властивості***

*Фармакодинаміка*

Механізм дії

Умеклідиніум/вілантерол є комбінацією інгаляційного антагоніста мускаринового рецептора тривалої дії та бета<sub>2</sub>-адренергічного агоніста тривалої дії. Після пероральної інгаляції обидві сполуки діють місцево на дихальні шляхи, внаслідок чого відбувається розширення бронхів у результаті різних механізмів дії.

*Умеклідиніум*

Умеклідиніум є антагоністом мускаринових рецепторів тривалої дії (антихолінергічний засіб). Він є похідним хінуклідину з активністю щодо численних підтипів мускаринових рецепторів. Умеклідиніум чинить бронхорозширювальну дію шляхом конкурентного пригнічення зв'язування ацетилхоліну з мускариновими рецепторами гладких м'язів дихальних шляхів. Виявлена повільна оборотність на підтипі M3 мускаринових рецепторів людини *in vitro* і тривала дія *in vivo* при безпосередньому введенні в легені в доклінічних моделях.

*Вілантерол*

Вілантерол є селективним агоністом бета<sub>2</sub>-адренергічних рецепторів тривалої дії (бета<sub>2</sub>-адренергічний агоніст). Фармакологічний вплив бета<sub>2</sub>-адренергічних агоністів, включаючи

вілантерол, принаймні частково пояснюється стимуляцією внутрішньоклітинної аденілатциклази, ферменту, який каталізує перетворення аденозинтрифосфату (АТФ) на циклічний-3',5'-аденозинмонофосфат (цАМФ). Підвищені рівні цАМФ викликають розслаблення гладких м'язів бронхів і пригнічують вивільнення медіаторів гіперчутливості негайного типу з клітин, особливо з опасистих клітин.

#### Фармакодинамічні ефекти

У 6-місячних дослідженнях III фази комбінація умеклідініум/вілантерол продемонструвала клінічно значуще поліпшення функції легень порівняно з плацебо (вимірювався об'єм форсованого видиху за першу секунду [ОФВ<sub>1</sub>]) протягом 24 годин після прийому один раз на день, що було зафіксовано через 15 хвилин після застосування першої дози (поліпшення порівняно з плацебо становило 112 мл ( $p < 0,001^*$ ). Максимальне покращення ОФВ<sub>1</sub> протягом перших 6 годин після прийому порівняно з плацебо в середньому становило 224 мл ( $p < 0,001^*$ ) на 24 тижні дослідження. Не отримано доказів розвитку тахіфілаксії внаслідок прийому лікарського засобу Аноро Елліпта за час досліджень.

*Кардіоелектрофізіологія.* Вплив умеклідініуму/вілантеролу на QT-інтервал оцінювали у плацебо- та моксифлоксацін-контрольованому дослідженні за участю 103 здорових добровольців, які протягом 10 днів приймали умеклідініум/вілантерол один раз на добу у дозі 113/22 мкг або 500/100 мкг (попередньо відміряна доза умеклідініуму у вісім разів вища за рекомендовану дозу, а доза вілантеролу у чотири рази вища за рекомендовану дозу). Максимальна середня різниця у пролонгації інтервалу QT (скоригована за методом Фредеріка, QT<sub>cF</sub>) порівняно з плацебо після поправки на вихідний рівень становила 4,3 (90 % ДІ [довірчий інтервал] 2,2–6,4) мілісекунди через 10 хвилин після інгаляції умеклідініуму/вілантеролу у дозі 113/22 мкг та 8,2 (90 % ДІ 6,2–10,2) мілісекунди через 30 хвилин після інгаляції умеклідініуму/вілантеролу у дозі 500/100 мкг. Отже, при інгаляції умеклідініуму/вілантеролу у дозі 113/22 мкг жодного клінічно значущого проаритмогенного ефекту, пов'язаного із пролонгацією інтервалу QT, не виникало.

Спостерігалось також дозозалежне збільшення частоти серцевих скорочень. Максимальна середня різниця частоти серцевих скорочень відмічалася через 10 хвилин після інгаляції порівняно з групою плацебо і після поправки на вихідний рівень становила 8,4 (90 % ДІ 7,0–9,8) уд/хв та 20,3 (90 % ДІ 18,9–21,7) уд/хв при застосуванні умеклідініуму/вілантеролу у дозі 113/22 мкг і 500/100 мкг відповідно.

Крім того, не спостерігалось клінічно значущого впливу на серцевий ритм при цілодобовому Холтерівському моніторингу у 53 пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), які отримували умеклідініум/вілантерол у дозі 55/22 мкг один раз на добу в одному 6-місячному дослідженні, як і в 55 пацієнтів, які отримували умеклідініум/вілантерол у дозі 113/22 мкг один раз на день в іншому 6-місячному дослідженні, та 226 пацієнтів, які отримували дозу 113/22 мкг один раз на день у 12-місячному дослідженні.

#### Клінічна ефективність та безпека

Клінічна ефективність комбінації умеклідініуму/вілантеролу, що застосовується один раз на добу, оцінювалася у восьми клінічних дослідженнях III фази у 6 835 дорослих пацієнтів з клінічним діагнозом ХОЗЛ: 5 618 пацієнтів — у п'яти 6-місячних дослідженнях (два плацебо-контрольовані та три з тіотропієм як активним препаратом порівняння), 655 пацієнтів — у двох тримісячних дослідженнях на витривалість / функцію легень та 562 пацієнтів — у 12-місячному підтверджувальному дослідженні.

---

\* У цьому дослідженні використовувалася процедура статистичного тестування з поступовим зниженням, і це порівняння було нижче рівня досягнення статистичної значущості. Отже, не можна зробити висновку про статистичну значущість цього порівняння.

### *Вплив на легеневу функцію*

У декількох дослідженнях лікарський засіб Аноро Елліпта продемонстрував поліпшення функції легень (що оцінювалося за зміною ОФВ<sub>1</sub> від початкового рівня). В одному 6-місячному дослідженні III фази у групі застосування лікарського засобу Аноро Елліпта продемонстровано статистично значуще поліпшення ОФВ<sub>1</sub> (первинна кінцева точка) на 24-му тижні порівняно з групою плацебо та кожною групою монотерапії. Крім того, лікарський засіб Аноро Елліпта продемонстрував клінічно значущий та статистично достовірний приріст ОФВ<sub>1</sub> порівняно з тіотропієм у двох із трьох 6-місячних досліджень (див. таблицю 1). Не спостерігалось послаблення бронхолітичного ефекту в динаміці.

### *Вплив на симптоми*

Задишка. Лікарський засіб Аноро Елліпта продемонстрував статистично достовірне та клінічно значуще зменшення задишки, яке оцінювали за допомогою транзиторного індексу задишки (TDI) на 24-му тижні (ключова вторинна кінцева точка) порівняно з плацебо (див. таблицю 1). Поліпшення показника TDI порівняно з групами монотерапії та групою, що приймала тіотропій, не було статистично значущим (див. таблицю 1).

Частка пацієнтів, у яких зміна показника TDI становила принаймні 1 одиницю (мінімальна клінічно значуща різниця (МКЗР) для TDI) на 24-му тижні, була більша у групі препарату Аноро Елліпта (58 %) порівняно з плацебо (41 %) та монотерапією (53 % для умеклідініуму та 51 % для вілантеролу).

Якість життя, пов'язана зі здоров'ям. Лікарський засіб Аноро Елліпта також продемонстрував поліпшення якості життя, вимірюване за допомогою Респіраторного опитувальника госпіталю Святого Георгія (SGRQ), про що свідчить зменшення кількості балів SGRQ на 24-му тижні порівняно з плацебо та монотерапією (див. таблицю 1). Лікарський засіб Аноро Елліпта продемонстрував статистично значуще зниження показника SGRQ порівняно з тіотропієм в одному з трьох досліджень з активним препаратом порівняння (див. таблицю 1).

Частка пацієнтів, у яких показник SGRQ знизився принаймні на 4 одиниці (4 одиниці — МКЗР для опитувальника SGRQ) на 24-му тижні, була більша у групі лікарського засобу Аноро Елліпта (49 %) порівняно з плацебо (34 %) та монотерапією (44 % для умеклідініуму та 48 % для вілантеролу). В одному дослідженні з активним препаратом порівняння більший відсоток пацієнтів, які отримували лікарський засіб Аноро Елліпта, відповів клінічно значущим поліпшенням показника SGRQ на 24-му тижні (53 %) порівняно з пацієнтами, які отримували тіотропій (46 %). В інших двох дослідженнях з активним препаратом порівняння аналогічна частка пацієнтів досягла принаймні МКЗР з лікарським засобом Аноро Елліпта та тіотропієм: 49 % і 54 % — з лікарським засобом Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг, 52 % і 55 % — з тіотропієм.

### *Використання препаратів для полегшення симптомів*

При застосуванні лікарського засобу Аноро Елліпта зменшилося використання препаратів для полегшення симптомів (сальбутамол) протягом 1–24 тижнів дослідження порівняно з плацебо та умеклідініумом (див. таблицю 1) та було продемонстровано збільшення кількості днів, коли не потрібно було застосовувати препарати для полегшення симптомів (в середньому на 11,1 %) порівняно з групою плацебо, у якій зменшилася кількість таких днів в середньому на 0,9 %.

У трьох 6-місячних дослідженнях, контрольованих за активним препаратом порівняння, застосування лікарського засобу Аноро Елліпта зменшило використання препаратів для полегшення симптомів порівняно з тіотропієм зі статистично значущими зниженнями у двох дослідженнях (див. таблицю 1). Лікарський засіб Аноро Елліпта також продемонстрував збільшення частки днів, коли не потрібно було використовувати препарати для полегшення симптомів, у всіх трьох дослідженнях (середній показник в межах від 17,6 % до 21,5 %) порівняно з тіотропієм (середній показник в межах від 11,7 % до 13,4 %).

Таблиця 1. Легенева функція, симптоми та якість життя, пов'язані зі здоров'ям, на 24-му тижні

Порівняння лікування лікарським засобом Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг	Різниця між показниками лікування <sup>1</sup> (95 % довірчий інтервал, значення p)			
	Вихідне значення ОФВ <sub>1</sub> (мл)	Показник TDI	Показник SGRQ	Використання препаратів для полегшення симптомів <sup>3</sup>
Аноро Елліпта (N = 413) порівняно з плацебо (N = 280)	167 (128, 207) < 0,001	1,2 (0,7, 1,7) < 0,001	-5,51 (-7,88, -3,13) < 0,001*	-0,8 (-1,3, -0,3) 0,001*
Аноро Елліпта (N = 413) порівняно з умеклідиніумом у дозі 55 мкг (N = 418)	52 (17, 87) 0,004	0,3 (-0,2, 0,7) 0,244	-0,82 (-2,90, 1,27) 0,441	-0,6 (-1,0, -0,1) 0,014*
Аноро Елліпта (N = 413) порівняно з вілантеролом у дозі 22 мкг (N = 421)	95 (60, 130) < 0,001	0,4 (-0,1, 0,8) 0,117	-0,32 (-2,41, 1,78) 0,767	0,1 (-0,3, 0,5) 0,675
Аноро Елліпта (N = 454) порівняно з тіотропієм у дозі 18 мкг (N = 451) (дослідження ZEP117115)	112 (81, 144) < 0,001	н/о	-2,10 (-3,61, -0,59) 0,006	-0,5 (-0,7, -0,2) < 0,001
Аноро Елліпта (N = 207) порівняно з тіотропієм у дозі 18 мкг (N = 203) (дослідження DB2113360)	90 (39, 141) < 0,001	0,1 <sup>2</sup> (-0,4, 0,5) 0,817	0,75 (-2,12, 3,63) 0,607	-0,7 (-1,2, -0,1) 0,022
Аноро Елліпта (N = 217) порівняно з тіотропієм у дозі 18 мкг (N = 215) (дослідження DB2113374)	60 (10, 109) 0,018*		-0,17 (-2,85, 2,52) 0,904	-0,6 (-1,2, 0,0) 0,069

N — чисельність популяції ІТТ (ІТТ — популяція всіх пацієнтів, рандомізованих для лікування)

мкг – мікрограм

н/о — не оцінювався

<sup>1</sup> Середньоквадратичне середнє.

<sup>2</sup> Об'єднані дані дослідження DB2113360 та дослідження DB2113374.

<sup>3</sup> Різниця середньої кількості застосування препарату на день протягом тижнів 1–24.

Більш високу дозу умеклідиніуму/вілантеролу (113/22 мкг) також вивчали у 24-тижневому плацебо-контрольованому клінічному дослідженні та у двох із трьох 24-тижневих

\* У цьому дослідженні використовувалася процедура статистичного тестування з поступовим зниженням, і це порівняння було нижче рівня досягнення статистичної значущості. Отже, не можна зробити висновку про статистичну значущість цього порівняння.

дослідженнях, контрольованих за активним препаратом. Результати були аналогічні результатам при застосуванні лікарського засобу Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг та додатково підтвердили ефективність лікарського засобу Аноро Елліпта.

#### *Загострення ХОЗЛ*

У 24-тижневому плацебо-контрольованому дослідженні пацієнтів із симптомним перебігом ХОЗЛ застосування лікарського засобу Аноро Елліпта знижувало ризик помірною/тяжкою загострення ХОЗЛ на 50 % порівняно з плацебо (на основі аналізу часу до розвитку першого загострення: відношення ризиків (ВР) 0,5; 95 % ДІ 0,3, 0,8;  $p = 0,004^*$ ), на 20 % порівняно з умеклідініумом (ВР 0,8; 95 % ДІ 0,5, 1,3;  $p = 0,391$ ) та на 30 % порівняно з вілантероном (ВР 0,7; 95 % ДІ 0,4, 1,1;  $p = 0,121$ ).

В одному з трьох досліджень у пацієнтів із симптомним перебігом ХОЗЛ застосування лікарського засобу Аноро Елліпта у порівнянні з тіотропієм знижувало ризик помірною/тяжкою загострення ХОЗЛ на 50 % (ВР 0,5; 95 % ДІ 0,3, 1,0;  $p = 0,044$ ). У двох інших дослідженнях ризик помірною/тяжкою загострення ХОЗЛ у пацієнтів із симптомним перебігом ХОЗЛ був відповідно на 20 % та 90 % вищим (ВР 1,2; 95 % ДІ 0,5, 2,6;  $p = 0,709$  та ВР 1,9; 95 % ДІ 1,0, 3,6;  $p = 0,062$  відповідно). Дизайн цих досліджень не був розроблений для оцінки впливу лікування на загострення ХОЗЛ, і пацієнти після розвитку загострення виключалися з дослідження.

#### *Дослідження, що підтверджують ефективність*

У рандомізованому подвійно сліпому 52-тижневому дослідженні (СТТ116855, ІМРАСТ) в 10 355 дорослих пацієнтів із симптомним перебігом ХОЗЛ, які перенесли одне чи кілька помірних або тяжких загострень протягом попередніх 12 місяців, порівнювалось лікування умеклідініумом/вілантероном (УМЕК/ВІ 55/22 мкг), флютиказону фууроатом / умеклідініумом / вілантероном (ФФ/УМЕК/ВІ 99/55/22 мкг) чи флютиказону фууроатом / вілантероном (ФФ/ВІ 99/22 мкг) один раз на добу в одному інгаляторі. Первинною кінцевою точкою в дослідженні була щорічна частота помірних чи тяжких загострень у тих, хто приймав ФФ/УМЕК/ВІ, порівняно з ФФ/ВІ або УМЕК/ВІ. Середня річна частота загострень становила 0,91, 1,07 та 1,21 для ФФ/УМЕК/ВІ, ФФ/ВІ та УМЕК/ВІ відповідно.

Порівняння ФФ/УМЕК/ВІ з ФФ/ВІ та УМЕК/ВІ показало статистично значуще зниження ризику помірною/тяжкою загострення на 14,8 % (на основі аналізу часу до розвитку першого загострення) (ВР 0,85; 95 % ДІ 0,80, 0,91;  $p < 0,001$ ) та на 16 % відповідно (на основі аналізу часу до розвитку першого загострення) (ВР 0,84; 95 % ДІ 0,78, 0,91;  $p < 0,001$ ).

#### *Витривалість та об'єм легень*

В одному з двох досліджень лікарського засобу Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг покращився час витривалості порівняно з таким при застосуванні плацебо, що оцінювалося за допомогою ступінчастого тесту човникової ходьби (шатл-тесту). В обох дослідженнях спостерігалось збільшення показників об'єму легень порівняно з плацебо у дорослих пацієнтів із ХОЗЛ з гіперінфляцією (функціональна залишкова ємність (ФЗЄ)  $> 120$  %). У першому дослідженні лікарський засіб Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг продемонстрував статистично достовірне та клінічно значуще покращення часу витривалості при фізичному навантаженні (69,4 секунди,  $p = 0,003$ ) порівняно з плацебо, що оцінювалось на 12 тижні дослідження через 3 години після застосування препарату (мінімальна клінічно значима різниця (МКЗР) для шатл-тесту становить 45–85 с). Покращення часу витривалості при фізичному навантаженні порівняно з таким при застосуванні плацебо спостерігалось на 2 день та зберігалось на 6-му та 12-му тижнях дослідження. У другому дослідженні різниця між показниками часу витривалості при фізичному навантаженні у групі застосування лікарського засобу Аноро Елліпта у дозі 55/22 мкг та плацебо на 12 тижні становила 21,9 секунди ( $p = 0,234$ ).

---

\* У цьому дослідженні використовувалася процедура статистичного тестування з поступовим зниженням, і це порівняння було нижче рівня досягнення статистичної значущості. Отже, не можна зробити висновку про статистичну значущість цього порівняння.

Лікарський засіб Аноро Еліпта у дозі 55/22 мкг також показав статистично значуще поліпшення вихідних показників об'єму легень порівняно з плацебо. В першому дослідженні вимірювання проводили на 12-му тижні перед застосуванням препарату та через 3 години після інгаляції: ємність вдиху становила 237 мл і 316 мл відповідно, залишковий об'єм –466 мл та –643 мл відповідно та функціональна залишкова ємність –351 мл і –522 мл відповідно (всі  $p < 0,001$ ). У другому дослідженні вимірювання також проводили на 12-му тижні до інгаляції препарату та через 3 години після інгаляції: ємність вдиху становила 198 мл і 238 мл відповідно, залишковий об'єм –295 мл і –351 мл відповідно та функціональна залишкова ємність –238 мл і –302 мл відповідно (всі  $p < 0,001^*$ ).

#### *Фармакокінетика*

Коли комбінацію умеклідиніуму та вілантеролу вводили інгаляційно, фармакокінетика кожного компонента була подібна фармакокінетиці, що спостерігалася при застосуванні кожної активної речовини нарізно. Отже, з фармакокінетичного погляду кожен компонент можна розглядати окремо.

#### *Абсорбція*

##### Умеклідиніум

Після введення умеклідиніуму у вигляді інгаляцій здоровим добровольцям  $C_{\max}$  досягалася через 5–15 хвилин. Абсолютна біодоступність умеклідиніуму, введеного у вигляді інгаляцій, становила в середньому 13 % від дози, де частка, пов'язана з пероральною абсорбцією, незначна. Після повторної дози умеклідиніуму, введеного у вигляді інгаляцій, рівноважний стан досягався протягом 7–10 днів з 1,5–1,8-кратним накопиченням.

##### Вілантерол

Після введення вілантеролу у вигляді інгаляцій здоровим добровольцям  $C_{\max}$  досягалася через 5–15 хвилин. Абсолютна біодоступність вілантеролу, введеного у вигляді інгаляцій, становила 27 %, де частка, пов'язана з пероральною абсорбцією, незначна. Після повторної дози вілантеролу, введеного у вигляді інгаляцій, рівноважний стан досягався протягом 6 днів з 2,4-кратним накопиченням.

#### *Розподіл*

##### Умеклідиніум

Після внутрішньовенного введення здоровим добровольцям середній об'єм розподілу становив 86 літрів. *In vitro* зв'язування з білками плазми крові людини становило в середньому 89 %.

##### Вілантерол

Після внутрішньовенного введення здоровим добровольцям середній об'єм розподілу в рівноважному стані становив 165 літрів. *In vitro* зв'язування з білками плазми крові людини становило в середньому 94 %.

#### *Біотрансформація*

##### Умеклідиніум

Дослідження *in vitro* показали, що умеклідиніум головним чином метаболізується цитохромом P450 2D6 (CYP2D6) і є субстратом для переносника Р-глікопротеїну (P-gp). Первинні метаболічні шляхи для умеклідиніуму є окисними (гідроксилування, О-деалкілування) з подальшою кон'югацією (глюкуронізація тощо), що спричиняє утворення низки метаболітів або зі зниженою фармакологічною активністю, або з невстановленою фармакологічною активністю. Системний вплив метаболітів є низьким.

---

\* У цьому дослідженні використовувалася процедура статистичного тестування з поступовим зниженням, і це порівняння було нижче рівня досягнення статистичної значущості. Отже, не можна зробити висновку про статистичну значущість цього порівняння.

## Вілантерол

Дослідження *in vitro* показали, що вілантерол головним чином метаболізується цитохромом P450 3A4 (CYP3A4) і є субстратом для переносника P-gp. Основними метаболічними шляхами для вілантеролу є O-деалкілування з подальшим утворенням ряду метаболітів зі значно зменшеною активністю щодо бета<sub>1</sub>- і бета<sub>2</sub>-адренорецепторів. Плазмовий метаболічний профіль після перорального застосування вілантеролу в радіоізотопному дослідженні у людини відповідає високому метаболізму першого проходження. Системний вплив метаболітів є низьким.

## Виведення

### Умеклідиніум

Плазмовий кліренс після внутрішньовенного введення становив 151 літр/годину. Після внутрішньовенного введення приблизно 58 % введеної міченої дози (або 73 % виявленої радіоактивності) виводилися з організму з фекаліями через 192 години після введення дози. Із сечею виводиться 22 % введеної міченої дози через 168 годин (27 % виявленої радіоактивності). Виведення речовини, пов'язаної з лікарським засобом, з фекаліями після внутрішньовенного введення свідчить про секрецію у жовч. У разі перорального застосування у здорових чоловіків-добровольців загальна радіоактивність виводилася з організму переважно з фекаліями (92 % введеної міченої дози або 99 % виявленої радіоактивності) через 168 годин після прийому дози. Менше 1 % перорально введеної дози (1 % виявленої радіоактивності) виводилося з організму із сечею, що свідчить про незначну абсорбцію після перорального застосування. Період напіввиведення умеклідиніуму після введення у вигляді інгаляції протягом 10 днів становив у середньому 19 годин у здорових добровольців, причому 3–4 % виводилося з організму у незміненому вигляді із сечею у рівноважному стані.

## Вілантерол

Плазмовий кліренс вілантеролу після внутрішньовенного введення становив 108 літрів/годину. Після перорального введення міченого вілантеролу було виявлено 70 % міченої дози у сечі і 30 % — у фекаліях. Первинним виведенням вілантеролу є метаболізм із наступним виділенням метаболітів із сечею і фекаліями. Період напіввиведення вілантеролу після введення у вигляді інгаляції протягом 10 днів становив у середньому 11 годин.

## Особливі групи пацієнтів

*Пацієнти літнього віку (> 65 років).* Фармакокінетичний аналіз популяції показав, що фармакокінетика умеклідиніуму і вілантеролу була схожа у пацієнтів з ХОЗЛ віком від 65 років і пацієнтів віком до 65 років.

*Порушення функції нирок.* У пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю не було виявлено жодних ознак збільшення системного впливу умеклідиніуму або вілантеролу ( $C_{max}$  і AUC) після введення умеклідиніуму/вілантеролу, де доза умеклідиніуму перевищувала рекомендовану дозу у два рази, а доза вілантеролу відповідала рекомендованій дозі. Зв'язування з білками плазми залишалось незмінним порівняно зі здоровими добровольцями.

*Порушення функції печінки.* У пацієнтів з помірними порушеннями функції печінки (клас В за класифікацією Чайлда — П'ю) не спостерігалось жодних ознак збільшення системного впливу умеклідиніуму або вілантеролу ( $C_{max}$  і AUC) після введення умеклідиніуму/вілантеролу, де доза умеклідиніуму перевищувала рекомендовану дозу у два рази, а доза вілантеролу відповідала рекомендованій дозі. Зв'язування з білками плазми залишалось незмінним порівняно зі здоровими добровольцями. Застосування умеклідиніуму/вілантеролу не оцінювали у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю.

## *Інші особливі групи*

Фармакокінетичний аналіз популяції показав, що не потрібно жодного коригування дози умеклідиніуму або вілантеролу залежно від віку, раси, статі, використання інгаляційних кортикостероїдів або маси тіла пацієнта. Дослідження, проведене у повільних метаболізаторів CYP2D6, не виявило жодних ознак клінічно значущого ефекту генетичного поліморфізму CYP2D6 щодо системного впливу умеклідиніуму.

## **Клінічні характеристики**

**Показання.** Для підтримуючої бронхолітичної терапії з метою полегшення симптомів у дорослих пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).

**Противоказання.** Підвищена чутливість до активних речовин або до будь-якої з допоміжних речовин.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій***

Клінічно значущі взаємодії з іншими лікарськими засобами, які застосовують одночасно, вважаються малоімовірними з огляду на низькі концентрації умеклідініуму/вілантеролу в плазмі крові після інгаляційної дози.

#### ***Бета-адреноблокатори***

Лікарські засоби, що містять бета-адреноблокатори, можуть послабити або антагонізувати ефект бета<sub>2</sub>-адренергічних агоністів, таких як вілантерол. Слід уникати одночасного застосування як неселективних, так і селективних бета-адреноблокаторів, якщо тільки немає вагомих причин для їх застосування.

#### ***Взаємодії на основі метаболізму і транспортування***

Вілантерол є субстратом цитохрому P450 3A4 (CYP3A4). Одночасне застосування сильнодіючих інгібіторів CYP3A4 (таких як кетоконазол, кларитроміцин, ітраконазол, ритонавір, телітроміцин) може пригнічувати метаболізм і збільшувати системний вплив вілантеролу. Одночасне застосування з кетоконазолом (400 мг) у здорових добровольців збільшувало середні показники AUC<sub>(0-t)</sub> і C<sub>max</sub> вілантеролу на 65 % і 22 % відповідно. Посилення дії вілантеролу не асоціювалося зі збільшенням системних впливів, пов'язаних із бета-адреноблокаторами, не впливало на частоту серцевих скорочень, рівень калію у крові або інтервал QT (скоригований за формулою Фредеріка). Слід бути обережним при одночасному застосуванні умеклідініуму/вілантеролу з кетоконазолом та іншими відомими сильнодіючими інгібіторами CYP3A4, оскільки є потенціал для збільшення системного впливу вілантеролу, що може підвищити ризик розвитку небажаних реакцій. Верапаміл, помірний інгібітор CYP3A4, істотно не впливає на фармакокінетику вілантеролу.

Умеклідініум є субстратом цитохрому P450 2D6 (CYP2D6). Фармакокінетику умеклідініуму у рівноважному стані оцінювали у здорових добровольців, які мають дефіцит CYP2D6 (повільні метаболізатори). Не спостерігалось жодного впливу на AUC або C<sub>max</sub> умеклідініуму при дозі, що перевищує норму у 8 разів. Приблизно 1,3-кратне збільшення AUC умеклідініуму спостерігалось при дозі, що перевищує норму у 16 разів, без впливу на C<sub>max</sub> умеклідініуму. З огляду на величину цих змін не очікується клінічно значущих лікарських взаємодій при одночасному введенні умеклідініуму/вілантеролу з інгібіторами CYP2D6 або при введенні пацієнтам з генетично дефіцитною активністю CYP2D6 (повільні метаболізатори).

Як умеклідініум, так і вілантерол є субстратами переносника P-глікопротеїну (P-gp). Вплив помірного P-gp інгібітору верапамілу (240 мг один раз на добу) на фармакокінетику умеклідініуму і вілантеролу у рівноважному стані оцінювали у здорових добровольців. Не було відмічено будь-якого впливу верапамілу на C<sub>max</sub> умеклідініуму або вілантеролу. Спостерігалось приблизно 1,4-кратне збільшення AUC умеклідініуму за відсутності впливу на AUC вілантеролу. З огляду на величину цих змін не очікується клінічно значущих лікарських взаємодій при одночасному введенні умеклідініуму/вілантеролу з інгібіторами P-gp.

#### ***Інші антимускаринові засоби і симпатоміметики***

Одночасне застосування умеклідініуму/вілантеролу з іншими мускариновими антагоністами тривалої дії, бета<sub>2</sub>-адренергічними агоністами тривалої дії або лікарськими засобами, що містять будь-який з цих засобів, не досліджували. Таке застосування не рекомендується,

оскільки це може посилити відомі побічні реакції інгаляційних мускаринових антагоністів або бета<sub>2</sub>-адренергічних агоністів (див. розділи «Особливості застосування» та «Передозування»).

#### *Гіпокаліємія*

Супутнє гіпокаліємічне лікування із застосуванням похідних метилксантину, стероїдів або некалійзберігаючих діуретиків може посилювати потенційний гіпокаліємічний ефект бета<sub>2</sub>-адренергічних агоністів, тому умеклідініум/вілантерол слід застосовувати з обережністю (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

#### *Інші лікарські засоби для лікування ХОЗЛ*

Хоча жодних традиційних досліджень взаємодії лікарських засобів *in vivo* не було проведено, інгаляційний засіб умеклідініум/вілантерол застосовували одночасно з іншими лікарськими засобами проти ХОЗЛ, включаючи симпатоміметичні бронхолітики короткої дії та інгаляційні кортикостероїди, без клінічних проявів лікарської взаємодії.

### **Особливості застосування**

#### *Астма*

Умеклідініум/вілантерол не слід застосовувати пацієнтам з астмою, оскільки цей лікарський засіб не досліджувався для цієї групи пацієнтів.

#### *Парадоксальний бронхоспазм*

Як і при застосуванні інших видів інгаляційної терапії, застосування умеклідініуму/вілантеролу може призвести до парадоксального бронхоспазму, який може бути небезпечним для життя. Терапію умеклідініумом/вілантеролом слід негайно припинити у разі розвитку парадоксального бронхоспазму та розпочати альтернативну терапію, якщо це потрібно.

#### *Не для використання під час гострого стану*

Умеклідініум/вілантерол не показаний для лікування гострих епізодів бронхоспазму.

#### *Погіршення перебігу захворювання*

Підвищення частоти використання короткодійних бронхолітиків для полегшення симптомів вказує на погіршення контролю захворювання. У разі погіршення перебігу ХОЗЛ на тлі лікування умеклідініумом/вілантеролом необхідно повторно оцінити стан пацієнта і тактику лікування.

#### *Вплив на серцево-судинну систему*

Вплив на серцево-судинну систему, такий як порушення серцевого ритму, наприклад миготлива аритмія та тахікардія, можливий після введення антагоністів мускаринових рецепторів і симпатоміметиків, включаючи умеклідініум/вілантерол. Пацієнти з клінічно значущим неконтрольованим серцево-судинним захворюванням були виключені з клінічних досліджень. Тому умеклідініум/вілантерол слід призначати з обережністю пацієнтам з тяжким серцево-судинним захворюванням.

#### *Антимускаринова активність*

З огляду на антимускаринову активність умеклідініуму/вілантеролу слід застосовувати з обережністю пацієнтам із затримкою сечі або закритокутовою глаукомою.

#### *Гіпокаліємія*

Бета<sub>2</sub>-адренергічні агоністи можуть спричинити значну гіпокаліємію у деяких пацієнтів, що може обумовити розвиток побічних реакцій з боку серцево-судинної системи. Зменшення калію в сироватці крові, як правило, є транзиторним.

Жодних клінічно значущих ефектів гіпокаліємії не спостерігалося у клінічних дослідженнях із застосуванням умеклідініуму/вілантеролу у рекомендованій терапевтичній дозі. Слід проявляти обережність, коли умеклідініум/вілантерол застосовують з іншими лікарськими засобами, які також можуть сприяти розвитку гіпокаліємії (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

#### *Гіперглікемія*

Бета<sub>2</sub>-адренергічні агоністи можуть спричинити транзиторну гіперглікемію у деяких

пацієнтів.

Жодних клінічно значущих впливів на рівень глюкози в плазмі не спостерігалось у клінічних дослідженнях із застосуванням умеклідініуму/вілантеролу у рекомендованій терапевтичній дозі. Після початку лікування умеклідініумом/вілантеролом необхідно більш ретельно контролювати рівень глюкози в плазмі крові у хворих на цукровий діабет.

#### *Супутні захворювання*

Умеклідініум/вілантерол слід застосовувати з обережністю пацієнтам із судомними розладами або з тиреотоксикозом, а також пацієнтам, які незвично реагують на бета<sub>2</sub>-адренергічні агоністи.

#### *Допоміжні речовини*

Цей лікарський засіб містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати цей лікарський засіб.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю***

**Вагітність.** Наразі відсутні дані про застосування умеклідініуму/вілантеролу вагітним жінкам. Умеклідініум/вілантерол слід застосовувати під час вагітності, тільки якщо очікувана користь для вагітної перевищує потенційний ризик для плода.

**Період годування груддю.** Невідомо, чи потрапляє умеклідініум або вілантерол у грудне молоко. Проте інші бета<sub>2</sub>-адренергічні агоністи виявляються у грудному молоці. Ризик для новонароджених/немовлят не можна виключати. Потрібно прийняти рішення про припинення годування груддю або припинення терапії умеклідініумом/вілантеролом з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини і користі терапії для жінки.

#### **Фертильність**

Відсутні дані про вплив умеклідініуму/вілантеролу на репродуктивну функцію людини.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*** Умеклідініум/вілантерол не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози***

#### **Дози**

##### *Дорослі*

Рекомендована доза — одна інгаляція лікарського засобу Аноро Елліпта 55/22 мкг один раз на добу.

Лікарський засіб Аноро Елліпта слід застосовувати один раз на добу в один і той же час кожного дня, щоб підтримувати розширення бронхів. Якщо дозу пропущено, наступну дозу застосовують наступного дня у звичний час. Максимальна доза становить одну інгаляцію лікарського засобу Аноро Елліпта 55/22 мкг один раз на добу.

#### **Особливі групи пацієнтів**

##### *Пацієнти літнього віку*

Коригування дози не потрібно для пацієнтів віком понад 65 років.

##### *Пацієнти з порушенням функції нирок*

Коригування дози не потрібно для пацієнтів з порушенням функції нирок.

##### *Пацієнти з порушенням функції печінки*

Коригування дози не потрібно для пацієнтів з порушенням функції печінки легкого та помірного ступеня. Не досліджувалося застосування лікарського засобу Аноро Елліпта пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю, тому його слід застосовувати з обережністю.

##### *Діти*

Лікарський засіб Аноро Елліпта не застосовували дітям (віком до 18 років) для лікування ХОЗЛ.

### Спосіб застосування

Лікарський засіб Аноро Елліпта призначений тільки для інгаляцій.


#### *Вказівки щодо застосування*

Інгалятор Елліпта містить попередньо розподілені дози і готовий до використання.

Інгалятор упакований у лоток, що містить вологопоглинаючий пакетик. Вологопоглинаючий пакетик слід викинути, його вміст не можна ковтати або вдихати. Пацієнта варто попередити, що лоток з інгалятором слід відкривати тоді, коли він буде готовий до інгаляції дози.

Інгалятор в лотку перебуває в положенні «закрито». Після того, як лоток буде відкрито, його можна викинути. Дата кінцевого застосування інгалятора становить 6 тижнів з дати відкриття лотка. Дату кінцевого застосування слід вписати у спеціально відведеному місці, позначеному «Не використовувати після:». Не слід застосовувати інгалятор після дати кінцевого застосування.

Упаковка лікарського засобу Аноро Елліпта та її вміст



#### *Порядок використання інгалятора (рис. 1)*

##### 1. Прочитати перед початком застосування

Якщо кришку інгалятора буде відкрито і закрито без інгаляції препарату, то дозу буде втрачено. Втрачена доза надійно зберігається в інгаляторі, але вже не є доступною для інгаляції.

Неможливо випадково прийняти надлишкову або подвійну дозу препарату за одну інгаляцію.




Рис. 1

## 2. Як підготувати дозу

Не відкривайте кришку, доки не будете готові прийняти дозу. Не струшуйте інгалятор. Потягніть кришку вниз, доки не почуєте «клац» (рис. 2).

Тепер препарат готовий до інгаляції. Лічильник доз відраховує в зворотному порядку на 1, що підтверджує готовність.

Якщо після того, як ви почули «клац», лічильник доз не відрахував дозу в зворотному порядку, то інгалятор не працює. Необхідно звернутися з інгалятором в аптеку за порадою. У будь-якому випадку струшувати інгалятор не слід.




Рис. 2

## 3. Як виконати інгаляцію препарату

Утримуйте інгалятор на відстані від рота і зробіть видих настільки глибокий, наскільки це для вас комфортно.

Не видихайте в інгалятор.

Розмістіть мундштук між губами і щільно притисніть їх навколо мундштука (рис. 3).

Не перекривайте пальцями повітряні клапани.

Зробіть один довгий, рівний, глибокий вдих, після чого затримайте дихання якомога довше (щонайменше 3–4 секунди).

Вийміть інгалятор з рота.

Повільно і обережно видихніть.



Розмістити губи по контуру мундштука для інгаляції. Не перекривати повітряні клапани пальцями

Рис. 3

Навіть при правильному використанні інгалятора Ви можете не відчувати препарат, зокрема його смак.

#### 4. Закрийте інгалятор

Якщо є необхідність в очистці мундштука, використовуйте суху тканину до закриття кришки. Щоб накрити мундштук, поверніть кришку на місце, рухаючи її вгору до упору (рис. 4).




Рис. 4

**Діти.** Лікарський засіб Аноро Елліпта не застосовували дітям (віком до 18 років) для лікування ХОЗЛ.

#### ***Передозування***

Передозування умеклідініуму/вілантеролу, ймовірно, матиме ознаки і симптоми, пов'язані з дією окремих компонентів, що узгоджується з відомими побічними реакціями інгаляційних мускаринових антагоністів (наприклад, сухість у роті, порушення зорової акомодатії та тахікардія) або реакціями, що спостерігалися при передозуванні інших бета<sub>2</sub>-адренергічних агоністів (наприклад, аритмія, тремор, головний біль, посилене серцебиття, нудота, гіперглікемія та гіпокаліємія).

У разі передозування лікування пацієнта має бути симптоматичним з відповідним моніторингом у разі потреби.

#### ***Побічні реакції***

##### Огляд профілю безпеки

Найбільш частою зареєстрованою побічною реакцією при застосуванні умеклідініуму/вілантеролу був назофарингіт (9 %).

##### Перелік побічних реакцій

Профіль безпеки лікарського засобу Аноро Елліпта ґрунтується на даних щодо застосування комбінації умеклідініуму/вілантеролу та окремих її компонентів, отриманих у межах програми клінічних досліджень, що включала 6 855 пацієнтів із ХОЗЛ, та під час постмаркетингового спостереження. До програми клінічних досліджень було залучено 2 354 пацієнти, що отримували умеклідініум/вілантерол один раз на добу у клінічних дослідженнях на етапі фази 3 тривалістю 24 тижні і більше, з яких 1 296 пацієнтів отримували рекомендовану дозу 55/22 мкг у 24-тижневому дослідженні, 832 пацієнти отримували високу дозу 113/22 мкг у 24-тижневому дослідженні і 226 пацієнтів отримували 113/22 мкг протягом 12-місячного дослідження.

Частота побічних реакцій, визначених у таблиці 2, включає показники загального коефіцієнта захворюваності, визначені при об'єднанні п'яти 24-тижневих досліджень і 12-місячного дослідження безпеки.

Застосовується така класифікація частоти виникнення побічних ефектів: дуже часто —  $\geq 1/10$ ; часто —  $\geq 1/100$  та  $< 1/10$ ; нечасто —  $\geq 1/1000$  та  $< 1/100$ ; рідко —  $\geq 1/10000$  та  $< 1/1000$ ; дуже рідко —  $< 1/10000$ ; невідомо — не можна визначити з наявних даних.

Таблиця 2

Системи та органи	Небажана реакція	Частота
Інфекції та інвазії	Інфекція сечовивідних шляхів Синусит Назофарингіт Фарингіт Інфекція верхніх дихальних шляхів	Часто
Порушення з боку імунної системи	Реакції гіперчутливості, включаючи висип, анафілаксію, ангіоневротичний набряк, кропив'янку	Нечасто Рідко Рідко Рідко
Порушення з боку нервової системи	Головний біль Тремор Дисгевзія Запаморочення	Часто Нечасто Нечасто Невідомо
Порушення з боку психіки	Тривога	Нечасто
Порушення з боку органів зору	Порушення чіткості зору Глаукома Підвищення внутрішньоочного тиску Біль в очах	Рідко Рідко Рідко Рідко
Порушення з боку серцево-судинної системи	Миготлива аритмія Суправентрикулярна тахікардія Ідіовентрикулярний ритм Тахікардія Суправентрикулярні екстрасистоли Посилене серцебиття	Нечасто
Порушення з боку органів дихальної системи, грудної клітки та середостіння	Кашель Ротоглотковий біль Дисфонія Парадоксальний бронхоспазм	Часто Часто Нечасто Рідко

Порушення з боку шлунково-кишкового тракту	Запор Сухість у роті	Часто
Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин	Висип	Нечасто
Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини	Спазм м'язів	Нечасто
Порушення з боку нирок та сечовидільної системи	Затримка сечі Дизурія Обструкція вихідного отвору сечового міхура	Рідко Рідко Рідко

#### Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

**Термін придатності.** 2 роки.

Термін придатності після відкриття лотка — 6 тижнів.

#### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 30 °С. За умов зберігання у холодильнику інгалятор слід повернути до кімнатної температури щонайменше за годину до використання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи.

Застосовувати протягом 6 тижнів після відкриття лотка.

У спеціально відведеному місці пацієнту слід зазначити кінцеву дату, після якої інгалятор необхідно викинути. Дата має бути зазначена одразу ж після діставання інгалятора з лотка.

**Упаковка.** Порошок для інгаляцій, дозований, по 55 мкг / 22 мкг / дозу, по 30 доз у порошковому інгаляторі № 1.

Інгалятор містить дві блистерні стрічки по 30 рівномірно розподілених чарунок, кожна з яких містить по 1 дозі кожної діючої речовини, що доставляються одночасно.

Пластиковий інгалятор зі світло-сірим корпусом, червоним ковпачком розпилювача та лічильником доз упаковано в лоток з фольги, що містить пакетик з вологопоглиначем із силікагелю. Лоток, запаяний відривною кришкою, поміщено у картонну коробку.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.** Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед / Glaxo Operations UK Ltd.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед, Прайорі Стріт, Веа, SG12 0DJ, Велика Британія / Glaxo Operations UK Ltd, Priory Street, Ware, SG12 0DJ, United Kingdom.

**Представник заявника.** ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна».

**Місцезнаходження представника заявника.** Україна, м. Київ, 02152, проспект Павла Тичини, буд. 1-В, тел: (044) 585-51-85, факс: (044) 585-51-92.

Також про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу можна повідомляти ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»:  
цілодобовий телефон: (044) 585-51-85  
email: oax70065@gsk.com

**Дата останнього перегляду.** 19.11.2025