

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

ДЕРМОВЕЙТ

Препаратнинг савдо номи: Дермовейт

Таъсир этувчи модда (ХПН): клобетазол пропионати

Дори шакли: крем

Таркиби:

фаол ингредиентлар: клобетазол пропионати 0,0525% м/м

фаол бўлмаган ингредиентлар: глицерил моностеарат 40-55 11,00% м/м, Арлацел 165 1,50% м/м, асалари мумининг ўрнини босувчи 6621 1,25% м/м (*Maxsus кўрсатмалар бўлимига қаранг*), цетостеарил спирти 8,40% м/м, пропиленгликоль 47,50% м/м, хлоркрезол 0,075% м/м, натрий цитрати 0,05% м/м, лимон кислотаси моногидрати 0,05% м/м, тозаланган сув 100,00% м/м гача.

Таърифи: оқ ёки деярли оқ рангли бир хил крем.

Фармакотерапевтик гурухи: жуда юқори фаолликка эга кортикостероидлар (IV гурухи).

АТХ коди: D07AD

Фармакологик хусусиятлари

Таъсир механизми

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидлар, яллигланишга қарши агентлар сифатида аллергик реакцияларнинг кечки фазасини ингибиция қилишни бир нечта механизми, жумладан, семиз ҳужайралар зичлигини камайтириш, хемотаксис ва эозинофиллар фаоллигини пасайтириш, лимфоцитлар, моноцитлар, семиз ҳужайралар ва эозинофиллар томонидан цитокинларнинг ишлаб чиқарилишини камайтириш орқали, шунингдек арахидон кислотаси метаболизмини бостириш орқали таъсир қиласди.

Фармакодинамик таъсирлари

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероид яллигланишга қарши, қичишишга қарши ва қон томирларни торайтирувчи хусусиятларга эга.

Фармакокинетикаси

Сўрилиши

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидлар шикастланмаган соғлом тери орқали тизимли равишда сўрилиши мумкин. Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларни тери орқали кириш даражаси кўп омиллар, шу жумладан дори препаратнинг асоси ва эпидермал тўсикнинг бутунлиги билан белгиланади. Тери орқали ўтиши окклузион боғловлар қўйилганда, терининг яллигланишида ва/ёки бошқа касалликлар мавжудлигига кучайиши мумкин.

Бир тадқиқотда териси соғлом одамларда қон плазмасида клобетазол пропионатининг ўртacha максимал концентрацияси, клобетазол пропионатининг 0,05% ли суртмаси 30 г дозада икkinchi марта суртилганидан кейин (биринчи қўллашдан кейин 13 соат ўтгач) 8 соат ўтгач 0,63 нг/мл ни ташкил қиласган. Клобетазол пропионати 0,05% креми 30 г дозада икkinchi марта суртилганидан кейин қон плазмасидаги ўртacha максимал концентрацияси, суртма суртилгандагига қараганда анча юқори бўлган ва суртилганидан кейин 10 соат ўтгач эришилган. Алоҳида тадқиқотда псориази ва экземаси бўлган пациентларда клобетазол пропионатининг 0,05% ли суртмаси 25 г бир марта қўлланганидан кейин 3 соат ўтгач плазмадаги ўртacha максимал концентрациялари мувофиқ 2,3 нг/мл ва 4,6 нг/мл ни ташкил қиласган.

Тақсимланиши

Айланиб юрувчи препаратнинг даражаси аниқланадиган даражадан анча паст бўлгани туфайли, сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларнинг тизимли экспозициясини баҳолаш учун фармакодинамик охирги нуқталардан фойдаланиш керак.

Метаболизми

Тери орқали сўрилганидан кейин сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларнинг метаболизми кортикостероидларни тизимли қўллангандаги метаболизмига ўхшаш кечиши тахмин қилинади. Улар асосан жигарда метаболизмга учрайди.

Чиқарилиши

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидлар буйрак орқали чиқарилади. Бундан ташқари, айrim кортикостероидлар ва уларнинг метаболитлари сафро билан ҳам чиқарилади.

Қўлланиши

Дермовейт крем препарати сиртга қўллаш учун мўлжалланган юкори фаолликка эга кортикостероид ҳисобланади, у катталарда, кекса ёшдаги пациентларда ва 1 ёшдан ошган болаларда стероидлар билан даволашга таъсиричан бўлган дерматозларда терининг яллигланиш симптомларини ва қичишишини енгиллаштириш учун қўлланилади.

Хусусан:

- псориаз (тарқалган бляшкасимон псориазни истисно қилганда);
- қийин даволанадиган дерматозлар;
- қизил яssi темиратки;
- дискоид қизил югурик;
- кучсизроқ стероидлар билан даволашга чидамли терининг бошқа касалликларини даволашда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Крем тери қопламасининг нам ва ҳўлланувчи юзаларига суртиш учун мўлжалланган.

Катталар, кекса ёшдаги пациентлар ва 1 ёшдан катта болалар

Препаратни теридаги шикастланган соҳани бутунлай ёпишга етарли минимал миқдорда суткасига 1 ёки 2 марта, 4 ҳафтадан кўп бўлмаган вақт давомида, ҳолат яхшилангунича эҳтиёткорлик билан суртиш керак. Сўнгра суртиш тез-тезлигини камайтириш ёки ундан кучсизроқ препарат билан даволашга ўтиш лозим.

Ҳар бир қўллашдан кейин юмшатувчи воситани қўйишдан олдин препаратни сўрилиши учун етарли вақтга қолдириш керак.

Касаллик зўрайишларини бартараф қилиш учун Дермовейт крем препарати билан такорий қисқа даволаш курсларини ўтказиш мумкин.

Терининг турғун шикастланишларида, айниқса, гиперкератозлар мавжуд бўлса, зарурат түғилганида, Дермовейт крем препарати таъсирини, ишлов берилган юзага полиэтилен пленкали окклизион боғлов қўйиш йўли билан кучайтириш мумкин. Одатда, қониқарли жавоб олиш учун кечасига окклизион боғлов қўйиш етарли ҳисобланади. Кейинчалик препаратни боғловсиз қўйиш ёрдамида яхшиланишга эришилади.

Ҳолат ёмонлашганида ёки 2-4 ҳафта давомида яққол яхшиланиш кузатилмаганида, ташхис ва даволашни қайта баҳолашни ўтказиш керак.

Даволаш 4 ҳафтадан ортиқ давом этмаслиги керак. Даволашни давом эттиришнинг зарурати бўлганида, кучсизроқ препаратлар билан даволашга ўтиш керак.

Максимал ҳафталиқ доза ҳафтасига 50 г дан ошмаслиги керак.

Атопик дерматит (экзема)

Назоратга эришилгач Дермовейт крем препарати билан даволашни аста-секин тўхтатиш ва юмшатувчи восита билан самарани бир маромда ушлаб турувчи терапияга ўтиш керак.

Дермовейт крем препарати билан даволаш кескин түхтатилганда олдинги дерматозларнинг симптомлари қайта пайдо бўлиши мумкин.

Қийин даволанадиган дерматозалар

Қайталанишлар тез-тез кузатиладиган пациентлар

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларни давомли қўллаб, ўткир ҳолатлар самарали даволанганидан кейин препаратни даврий қўллаш (суткада 1 марта, ҳафтада 2 марта, окклизион боғловсиз) имкониятини кўриб чиқиш керак. Айнан шу тартибга мувофиқ даволаш қайталанишлар тез-тезлигини пасайтиришга ёрдам бериши кўрсатилган.

Препаратни терини илгари шикастланган барча соҳаларига ёки терини рецидив ривожланиши мумкин бўлган соҳаларига суртишни давом эттириш зарур. Ушбу даволаш режимини одатдаги кундалик юмшатувчи воситалардан фойдаланиш билан бирга қўллаш керак. Беморнинг ҳолати, ҳамда давомли даволаш курсидан кутиладиган потенциал фойда ва ҳавф мунтазам равишда баҳолаб турилиши керак.

Болалар

Дермовейт крем препаратини 1 ёшдан кичик болаларда қўллаш мумкин эмас.

Болалар сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларнинг маҳаллий ва тизимли ножўя реакциялари ривожланишига мойилроқ бўладилар ва, умуман, катталарга қараганда болаларда даволашнинг қисқароқ курслари ва фаоллиги камроқ воситалари қўлланиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Препаратни кутилган клиник самарасига эришиш учун зарур бўлган минимал миқдорда эҳтиёткорлик билан қўллаш керак.

Кекса ёшдаги пациентлар

Клиник тадқиқотларда кекса ёшдаги пациентлар ва ёшроқ пациентлар орасида даволашдаги натижаларда фарқланишлар аниқланмаган. Кекса ёшдаги пациентларда жигар ва буйрак функциялари пасайиши ҳолатлари юқорироқ частотада кузатилиши препаратнинг тизимли сўрилиши шартида чиқарилиш жараёнини секинлаштириши мумкин. Шу сабабга кўра, кутилган клиник самарага эришиш учун препаратнинг минимал миқдорини иложи борича қисқароқ вақт давомида қўллаш керак.

Буйрак/жигар функциясининг бўзилиши бўлган пациентлар

Тизимли сўрилиш шартида (узоқ вақт давомида терининг катта юзали участкасига суртилганда) метаболизм ва чиқарилиш жараёнлари секинлашиши мумкин, бу ўз навбатида, тизимли токсик таъсирнинг ривожланиши хавфини оширади. Шу сабабга кўра, кутилган клиник самарага эришиш учун препаратнинг минимал миқдорини иложи борича қисқароқ вақт давомида қўллаш керак.

Қўлланилиши ва ишлатиш

Бу препаратни қўллаш ва ишлатиш учун маҳсус талаблар мавжуд эмас.

Ножўя таъсирлари

Ноҳуш дори реакциялари (НДР) MedDRA органлари синфининг тизимида ва учраш тезлигига мувофиқ санаб ўтилган.

Учраш тезлиги қуйидагича белгиланади:

Жуда тез-тез ($\geq 1/10$),

Тез-тез ($\geq 1/100$, лекин $< 1/10$),

Тез-тез эмас ($\geq 1/1000$, лекин $< 1/100$),

Кам ҳолларда ($\geq 1/10000$, лекин $< 1/1000$),

Жуда кам ҳолларда ($< 1/10000$), шу жумладан алоҳида ҳолатлар.

Қайд этилгандан кейинги қўллашда олинган маълумотлар

Инфекцион ва паразитар касалликлар

Жуда кам ҳолларда: оппортунистик инфекция

Иммун тизими томонидан бузилишлар

Жуда кам ҳолларда: маҳаллий ўта юқори сезувчанлик

Эндокрин тизими томонидан бузилишлар

Жуда кам ҳолларда: гипоталамо-гипофизар-буйрак усти безлари (ГГБУБ) тизимининг бостирилиши.

Кушинг синдроми белгилари: (масалан, ойсимон юз, марказий тип бўйича семириш), тана вазни қўшилишининг секинлашиши/болаларда бўй ўсишининг секинлашиши, остеопороз, глаукома, гипергликемия/глюкозуря, катаракта, артериал гипертензия, тана вазнини ошиши/семириш, эндоген кортизолнинг концентрациясининг пасайиши, алопеция, соchlарнинг, синувчанлиги.

Кўриш аъзоси томонидан бузилишлар

Жуда кам ҳолларда: катаракта, марказий сероз хориоретинопатия, глаукома

Тери ва тери ости тўқималари томонидан бузилишлар

Тез-тез: қичишиш, терини маҳаллий ачишишини ҳис қилиш/терини оғриклилиги.

Тез-тез эмас: тери атрофияси*, стриялар*, телевангиоэктазия*.

Жуда кам ҳолларда: терини юпқаллашиши*, терида ажин кўпайиши*, терининг куруқлиги*, пигментациянинг ўзгариши*, гипертрихоз, асосий касаллик симптомларини зўрайиши, аллергик контакт дерматит/дерматит, пустулёз псoriasis, эритема, тошма, эшакеми, акне.

Умумий бузилишлар ва суртилган жойдаги бузилишлар

Жуда кам ҳолларда: суртилган жойдаги таъсирланиш/оғриқ кузатилиши мумкин.

* Терининг гипоталамус-гипофизар-буйрак усти безлари (ГГБУБ) тизимининг бостирилишига, маҳаллий ва/ёки тизимли самараларига нисбатан иккиласчидан ўзгаришилари.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Дермовейт крем препаратини қўйидаги ҳолатларни даволаш учун қўллаш мумкин эмас:

- терининг даволанмаган инфекциялари;
- розацея (пушти ҳуснбузарлар);
- оддий ҳуснбузарлар;
- яллиғланишсиз қичишиш;
- перианал ва генитал қичишиш;
- периорал дерматит.

Бир ёшдан кичик болалардаги дерматозларда, шу жумладан дерматитларда Дермовейт крем препаратини қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

CYP3A4 изоферментини ингибиция қилиши мумкин бўлган препаратлар (масалан, ритонавир ва итраконазол) билан бир вактда қўлланганда, кортикостероидларнинг метаболизмини бостирилиши юз бериши кўрсатилган, бу уларнинг тизимли экспозициясини ошишига олиб келади. Бундай ўзаро таъсирнинг клиник аҳамиятини даражаси кортикостероидларнинг дозаси ва қўллаш усулига, шунингдек CYP3A4 изоферменти ингибиторининг фаоллигига боғлиқ.

Номутаносиблиги

Номутаносиблиги аниқланмаган.

Махсус қўрсатмалар

Дермовейт крем препаратини кортикостероидларга маҳаллий ёки анамнезида препаратнинг таркибига киравчи ёрдамчи моддалардан биронтасига ўта юқори сезувчанлик бўлган пациентларда эҳтиёткорлик билан қўллаш керак. Ўта юқори сезувчанликнинг маҳаллий реакциялари (*Нојсүя таъсирлари бўлимига қаранг*) даволаш ўтказилаётган ҳолатнинг симптомларига ўхшаш бўлиши мумкин.

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган стероидларнинг тизимли сўрилишини кучайиши натижасида айрим пациентларда гиперкортицизмнинг (Кушинг синдроми) симптомлари

ва гипоталамус-гипофизар-буйрак усти безлари (ГГБУБ) тизимини қайтувчан бостирилиши ривожланиши мумкин, бу глюкокортикоидли етишмовчиликка олиб келади. Агар юқорида кўрсатилган симптомларнинг биронтаси кузатилса, препарат суртилиши тез-тезлигини аста-секин камайтириш йўли билан ёки кучсизроқ кортикоидли алмаштириш йўли билан бекор қилиш керак. Даволашни кескин тўхтатиш глюкокортикоидли етишмовчиликка олиб келиши мумкин (*Ножсўя таъсирлари бўлимига қаранг*).

Тизимли самаралар кучайшининг хавф омиллари:

- сиртга қўллаш учун мўлжалланган стероиднинг фаоллиги ва дори шакли;
- таъсирнинг давомийлиги;
- катта майдон юзасига суртилиши;
- терининг ёпиқ соҳаларида қўллаш (масалан, кепакланган ёки окклизион боғловли соҳалар (гўдакларда тагликлар окклизион боғлов ролини ўйнаши мумкин);
- шоҳ қатламнинг юқори нামлиги;
- терининг юз каби юпқа соҳаларида қўллаш;
- шикастланган терига ёки тери тўсиги бузилиши мумкин бўлган бошқа ҳолатларда суртиш;
- катталар билан солиширганда болалар ва чақалоқларда сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикоидларнинг пропорционал катта микдори сўрилиши мумкин, шу сабабдан, улар тизимли нохуш самаралар ривожланишига кўпроқ даражада дучор бўлишлари мумкин. Бу болалар етарлича ривожланмаган тери тўсигига эга бўлишлари ва катталар билан солиширганда тана юзаси майдонининг тана массасига нисбати каттароқ бўлиши билан боғлик.

Тизимли ва/ёки маҳаллий кортикоидларни қўллаган пациентларда кўриш қобилиятининг бузилишлари ҳақида маълумотлар қайд этилган. Агар пациентда кўз ўтқиригининг ноаниқлиги ёки кўриш билан боғлик бошқа бузилишлар аниқланса, катаракта, глаукома ёки марказий сероз хориоретинопатияси каби касалликларни ўз ичига олган сабаблар мажмуасини баҳолаш имкониятини кўриб чиқиш лозим.

Болалар

Чақалоқлар ва 12 ёшгача бўлган болаларни сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикоидлар билан давомли узлуксиз даволашдан иложи борича сақланиш керак, чунки бу буйрак усти безлари функциясининг бостирилишига олиб келиши мумкин.

Болалар сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикоидлар билан даволашда атрофик ўзгаришлар ривожланишига мойил бўладилар. Агар болаларда Дермовейт крем препаратини қўллаш талаб қилинса, даволаш курси бир неча кун билан чекланган бўлиши ва ҳар ҳафтада қайта кўрилиши лозим.

Окклизион боғлов кўйилганида инфекциялар хавфини ошиши

Тери бурушган жойларида, шунингдек окклизион боғлов кўйилганида ҳосил бўлувчи иссиқ ва нам шароитлар бактериал инфекция ривожланишига ёрдам беради. Окклизион боғлов ишлатилганида, янги боғлов қўйиш олдидан терини тозалаш керак.

Псориазда қўлланиши

Псориазни даволашда сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикоидлардан этиёткорлик билан фойдаланиш керак, чунки айрим ҳолларда касалликнинг қайталанишларини пайдо бўлиши, препаратга резистентлик ривожланиши, терининг тўсик фаолиятини бузилиши туфайли тарқалган пустулёз пайдо бўлишини хавфи оқибатида маҳаллий ва тизимли реакциялар пайдо бўлиш хавфи қайд этилган. Даволаш даврида бундай пациентлар даволовчи шифокорнинг доимий кузатуви остида бўлишлари керак.

Хамроҳ инфекциялар

Даволанаётган яллигланиш ўчоқлари инфекцияланганда, тегишли антибактериал (микробларга қарши) терапияни қўллаш керак. Инфекциянинг тарқалишини ҳар қандай

белгиларида сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидлар билан даволашни тўхтатиш ва тегишли антибактериал даволанишини буюриш керак.

Оёкларнинг сурункали яралари

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидлар баъзида оёкларнинг сурункали яралари атрофидаги дерматитни даволаш учун кўлланади. Лекин бундай қўллаш ўта юқори сезувчанликнинг маҳаллий реакциялари юқори тез-тезликда ривожланиши, ҳамда маҳаллий инфекция ривожланишини юқори хавфи билан бирга кечади.

Юзга суртиш

Препаратни юзга суртиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки бу соҳа кўпроқ атрофик ўзгаришларга мойил бўлади.

Препарат суртилганида, даволаш курси бир неча қунлар билан чекланиши лозим.

Қовоқларга суртиш

Препарат қовоқларга суртилганда уни кўзга тушишини олдини олиш учун эҳтиёткорликка риоя қилиш керак, чунки кўп марта таъсир қилиши натижасида катаракта ва глаукома ривожланиши мумкин.

Дермовейт крем препарати таркибида парафин мавжуд. Беморга, агар у препаратни қўллаш пайтида чекса ёки очиқ олов яқинида бўлса, жиддий куйиш хавфи мавжудлиги тўғрисида маълумот берилиши керак. Ушбу препарат теккан мато (кийим-кечак, кўрпа жилдлари, боғловлар ва бошқалар) осон ёнади ва жиддий ёнгин хавфини келтириб чиқаради. Кийим ва кўрпа жилдларини ювиш модда миқдорини камайтириши мумкин, аммо уни бутунлай йўқ қиласмиайди.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланиши

Фертиллик

Сиртга қўллаш учун мўлжалланган кортикостероидларни одамлардаги фертилликка таъсирини баҳолаш учун маълумотлар қайд этилмаган.

Каламушларга тери остига юборилганда клобетазол жуфтлашиш қобилятига таъсир кўрсатмаган, лекин энг юқори дозада қўлланганда фертилликни пасайиши аниқланган.

Ҳомиладорлик

Дермовейт крем препаратини ҳомиладор аёлларда қўллашга оид маълумотлар чекланган. Ҳайвонларда ҳомиладорлик вақтида кортикостероидларни сиртга суртиб қўлланилиши ҳомилада ривожланиш аномалияларини келтириб чиқариши мумкин.

Ушбу маълумотларнинг одам учун клиник аҳамияти аниқланмаган.

Ҳомиладорлик вақтида Дермовейт крем препаратини қўллаш имкониятини фақат агар она учун кутилаётган фойда ҳомила учун хавфдан юқори бўлган ҳолдагина кўриб чиқиш мумкин. Препаратнинг минимал миқдорини минимал вақт даври давомида қўллаш керак.

Эмизиш даври

Лактация даврида кортикостероидларни сиртга суртиб қўллашнинг хавфсизлиги аниқланмаган.

Кортикостероидларни сиртга суртиб қўлланиши кўкрак сути билан аниқлаш мумкин бўлган миқдорда чиқарилиши учун етарлича бўлган препаратни тизимли сўрилишига олиб келиш ёки келмаслиги аниқланмаган.

Лактация даврида Дермовейт крем препаратини қўллаш имкониятини фақат она учун кутилаётган фойда, бола учун хавфдан юқори бўлган ҳолдагина кўриб чиқилиши керак.

Лактация даврида Дермовейт крем препарати қўлланганда, препаратни чақалоқ томонидан тасодифан ютилишидан сакланиш учун, кўкрак соҳасига қўйиш мумкин эмас.

Препаратнинг вазифаларни бажарии ёки характ ва когнитив қўниқмаларни талаб қилувчи вазифаларни бажарии қобилятига таъсири

Дермовейт крем препаратини транспорт воситаларини бошқариш ёки механизмлар билан ишлаш қобилятига таъсирига оид тадқиқотлар ўтказилмаган. Дермовейт крем препаратининг ноxуш реакциялар профилига кўра, фаолиятнинг бу турларига препаратнинг ножўя таъсири кутилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Белгилари ва симптомлари

Сиртга суртиб қўлланганида Дермовейт крем препарати тизимли реакциялар ривожланиши учун етарли миқдорларда сўрилиши мумкин. Дозани ҳаддан ташқари ошириб юборилишининг эҳтимоли кам, лекин дозани сурункали ошириб юборилиши ёки нотўғри ишлатилишида гиперкортицизм симптомлари ривожланиши мумкин (*Ноҗсўя таъсиrlари бўлимига қаранг*).

Даволаш

Доза ошириб юборилган ҳолатда глюокортикоидли етишмовчилик ривожланишининг хавфи мавжуд бўлгани учун Дермовейт крем препаратини суртиш тезлигини камайтириш ёки кучсизрок кортикоид билан алмаштириш йўли билан аста-секин бекор қилиш керак.

Кейинги даволашни клиник кўрсатмалар ёки Миллий токсикологик марказнинг тавсияларига, шундай Марказ бўлса, мувофик амалга ошириш керак.

Чиқарилиш шакли

Крем 0,05% м/м, 25 г тубада № 1

25 г дан юмшоқ алюмин тубаларда, ички юзаси асоси эпоксид қатронли бўлган грунт бўёқ қопланган, оғзига мембрана қопланган ва латекс герметик қаватли полипропилен қопқоқ ёпилган.

1 тубадан қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутига жойланган.

Сақлаш шароитлари

30°C дан паст бўлган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

24 ой.

Препарат яроқлилик муддати ўтганидан кейин қўлланилмасин.

Дорихоналардан олиш тартиби

Рецепт бўйича.

Рўйхатдан ўтказилганик гувохномасининг эгаси:

GlaxoSmithKline Export Limited

980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS

UK

ГлаксоСмитКляйн Экспорт Лимитед

980 Грейт Вест Роад, Брендфорд

Мидлсекс, TW8 9GS

Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи:

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna,
ul. Grunwaldzka 189

60 – 322 Poznań

Poland

Делфарм Познань Спулка Акцыйна,

Грюнвальдска 189

60 – 322 Познань

Польша

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътиrozлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:
«NOVOTEK» МЧЖ

100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Ниёзбек йўли кўч., 2-уй.
Телефон: +99871 1206035

Мобил телефон: +99899 8955556; +99890 3280128

Факс: +99871 1207306

Электрон манзил: ved@novotek.uz, oax70065@gsk.com

Савдо белгилари GSK компаниялар гурухига тегишли ёки унинг лицензияси асосида ишлатилмоқда.

©2023 GSK компаниялар гуруҳи ёки унинг лицензиарлари.