

## El dolor provocado por la neuralgia posherpética (NPH) puede afectar las actividades de la vida diaria:

- **Más del 60 % de los pacientes tendrá insomnio o trastornos del sueño.**<sup>7</sup>



- **Los pacientes pueden tener inestabilidad emocional, ansiedad y depresión. El dolor interfiere en el disfrute de vida en más de la mitad de los pacientes.**<sup>7</sup>

- **Los pacientes pueden tener problemas para caminar y para llevar a cabo actividades cotidianas.**<sup>7</sup>



\*Con base en una cohorte de 261 pacientes

**¡Pregúntele a su médico sobre la prevención del herpes zóster!**

**REFERENCIAS:** 1. Centers for disease control and prevention. Blood pressure. Available at: <https://www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm>. Last visited 19 April 2024. 2. Centers for disease control and prevention. Measure your blood pressure. Available at: <https://www.cdc.gov/bloodpressure/measure.htm> Last visited 19 April 2024. 3. Cohen JI. Clinical practice: Herpes zoster. N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3):255-63. 4. Kilgore PE, Kruszon-Moran D, Seward JF, Jumaan A, Van Loon FP, Forghani B, McQuillan GM, Wharton M, Fehrs LJ, Cossen CK, Hadler SC. Varicella in Americans from NHANES III: implications for control through routine immunization. J Med Virol. 2003;70 Suppl 1:S111-8. 5. Harpaz R, et al. MMWR Recomm Rep. 2008. 6. Curhan SG, Kawai K, Yawn B, Rexrode KM, Rimm EB, Curhan GC. Herpes Zoster and Long-Term Risk of Cardiovascular Disease. J Am Heart Assoc. 2022 Dec 6;11(23):e027451. 7. Drolet M, Brisson M, Schmader KE, Levin MJ, Johnson R, Oxman MN, Patrick D, Blanchette C, Mansi JA. The impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on health-related quality of life: a prospective study. CMAJ. 2010 Nov 9;182(16):1731-6

# HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y HERPES ZÓSTER (Culebrilla)


**GSK**

Elaborado por GSK.

Para reporte de eventos adversos o quejas de producto contacte a GSK al correo electrónico [fv.aecaricam@gsk.com](mailto:fv.aecaricam@gsk.com) o a los teléfonos: Guatemala: (502)2376-1930 • República Dominicana: +1 (829) 956-6335 • Panamá: (507)833-6768. Oficinas GSK, Oceanía Business Plaza Torre 1000 piso 34, Panamá, República de Panamá, C.A. Derechos reservados para GSK. Marcas registradas son propiedad y/o licenciadas por el grupo de Compañías GSK. Consulte con su médico. Este material está dirigido a población sujeta a vacunarse contra herpes zóster / culebrilla. El contenido de este material no pretende sustituir la atención médica profesional. Solo un médico puede diagnosticar y tratar una condición médica como herpes zóster / culebrilla. Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por GSK.

NP-RCH-HZU-LBND-240011. Fecha de Aprobación: Mayo 2025. Fecha de Expiración: Junio 2026.

- La hipertensión arterial es una presión arterial que se mantiene en valores superiores a los rangos normales.<sup>1</sup>



- Cuando alguien tiene hipertensión, puede desarrollar otros problemas de salud, tales como accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca.<sup>1</sup>


Medir la presión arterial es la única forma de detectar la hipertensión arterial.<sup>1</sup>



Casi la mitad de los adultos tienen hipertensión arterial y 3 de cada 4 de ellos no lograrán tenerla estabilizada.<sup>2</sup>



- El herpes zóster es el resultado de la reactivación del virus de la varicela-zóster (VVZ), que causa la varicela.<sup>3</sup>
- La infección se desplaza a través de los nervios sensitivos hasta la piel, donde produce erupciones y dolor.<sup>3</sup>
- Más del 99,6 % de la población que llega a los 40 años ha sido infectada con el virus de la varicela-zóster (VZV).<sup>4</sup>



El virus de la varicela-zóster se reactivará y se desarrollará herpes zóster en

**1 de cada 3 individuos<sup>5</sup>**



El virus de la varicela-zóster causa daños directos en los vasos sanguíneos, como:<sup>6</sup>

- Inflamación local.
- Cambios patológicos.
- Daño crónico en las arterias.
- Oclusión de los vasos.
- Falta de oxígeno (isquemia).

¿Sabía?

- El herpes zóster se relaciona con un riesgo a largo plazo de tener un evento cardiovascular de más del 30 %.<sup>6</sup>
- La predisposición a tener un evento cardiovascular puede persistir hasta más de 12 años después de haber tenido herpes zóster.<sup>6</sup>

¿Qué es la neuralgia posherpética (NPH)?

- Es el dolor persistente que permanece después de que desaparece la erupción en la piel.<sup>5</sup>
- Puede durar meses o años.<sup>5</sup>
- La neuralgia posherpética puede producir dolor insoportable en la mitad de los pacientes con herpes zóster.<sup>5</sup>



La neuralgia posherpética provoca dolor diario que puede durar minutos o permanecer por tiempo indefinido.<sup>5</sup>